





VIII

H

12











200

# HORTUS INDICUS MALABARICUS.

*Continens*

Regni Malabarici apud Indos celeberrimi  
omnis generis Plantas rariores,

*Latinis, Malabaricis, Arabicis, & Bramanum Characteribus nominibusque expressas,*  
Unà cum Floribus, Fructibus & seminibus, naturali magnitudine à  
peritissimis pictoribus delineatas, & ad vivum exhibitas.

*Addita insuper accuratâ earundem descriptione, quâ colores, odores, saporés, facultates,  
& præcipue in Medicinâ vires exactissimè demonstrantur.*

A D O R N A T U S

P E R

HENRICUM van RHEEDE, van DRAAKENSTEIN,  
Nuperrimè Malabarici Regni Gubernatorem, nunc supremi Concessus apud  
Indos Belgas Senatorem Extraordinarium, & primum successorem  
loco ordinario destinatum,

E T

JOHANNEM CASEARIUM, Ecclesiast. in Cochîn.

*Notis adauxit, & Commentariis illustravit*

ARNOLDUS SYEN, Medicinæ & Botanices in Academia  
Lugduno-Batava Professor.



A M S T E L O D A M I,

Sumptibus { JOANNIS van SOMEREN,  
ET  
JOANNIS van DYCK.


Anno cld Idc LXXVIII.





ILLUSTRISSIMO ET NOBILISSIMO  
D O M I N O,  
D<sup>o</sup>. JOANNI MAATSUIKER,  
GUBERNATORI INDIAE  
O R I E N T A L I S,

Quæ sub ditione est Belgii Fœderati, Domi-  
norumque Nobilissimorum Ordinis Socie-  
tatis Indicæ Generalissimo.

 *Ircumspicientibus nobis quibus potissi-  
mum hos labores nostros in concinnan-  
do Horto Malabarico impensos in-  
scriberemus ac offerremus, nemo pro-  
pius, nemo opportuniùs, quam Tu occurris. Illu-  
strissime & Nobilissime Domine, cui illud præstan-  
dum erat, non ut Te patronum hujus operis deli-  
gamus, verùm ob eas causas, tum quod Tu ho-  
rum locorum Malabaricorum, in quibus Hortus  
noster est productus, ac concinnatus, regimen ac  
administrationem summa cum dexteritatis laude  
teneas, tum quod rerum novarum & rararum in  
hisce terris amantissimus sis, tum denique quod nos  
in hisce locis tanquam in proprio horto casulam  
aliquam possidemus, nobisque oculos nostros ani-  
mum.*

\*\*\*



## DEDICATIO.

*mumque in amœnissimis plantis, quas ubertim proferunt, depascere detur. Tibi igitur, Vir Illustrissime & Nobilissime, & omni laude dignissime, hoc quidquid est operis, quod à Nobis profectum est, offerimus, nulli dubitantes quin patieris hosce labores nostros amplissimo Nomini Tuò inscribi, eosque serena fronte suscipies, quodque eos non minus æstimabis ob hoc quod ab iis profecti sint, quorum negotia & studia ante à plantarum indagatione longè diversa ac remota fuère.*

Amplissimo Nomini Tuò

*Additissimi*

H. v. RHEEDE, van Draakensteyn.

JOANNES CASEARIUS,  
*Ecles. in Cochis.*

P R A-



# P R Æ F A T I O

A D

## L E C T O R E M.



Habe hic, amice Lector, descriptionem *Plantarum* quas hæc terra *Malabarica* profert, quæ ferme omnes suas vites medicas ostentant; opetis si quæ est laus, eam non sine jure meretur Nobilis Dominus HENRICUS VAN RHEEDE, horum locorum Malabaricorum quos præpotentes Ordines Societatis Indiæ in sua possessione habent, perfectus, vir in re militari strenuus & gubernationis politicæ summè gnarus, utpote qui hoc opus primum promovit & direxit, omnemque opem quod efficeretur, attulit; etenim hic Nobilis Dominus, ut de eo reipsa satis cognovi, ubi secum perpenderat quantum in eo emolumenti situm esset, si plana & exacta descriptio harum plantarum hujus terræ haberetur, quodque non tantum illud curiosis & plantarum novarum amantissimis mirè placeret, sed quod in Medicina rum maxime quæ in hoc celo ac solo usui est, summè prodesset atque adeo rebus Ordinum præpotentium Societatis Indiæ conducere, flagrantissimo desiderio semper incensus fuit, ut eam descriptionem plantarum nancisceretur, idque adeo ut ipse manum operi libentissimè admovisset, ac descriptionem ipsam in se suscepisset, si non rebus militaribus ac politicis nimium fuisset implicitus ac distractus; verum cum ipsi ad hoc opus nullum restaret tempus, in expeditione sui propositi diu fuit retentus, donec interveniente aliquo tempore relciverat, Patrem esse MATTHÆUM Ordinis S. *Josephi* Carmelitæ discalceatum Neapolitanum, in hisce terris, qui insigni in plantis sciencia & earum rerum longa experientia excelleret, qui cum in suo proposito posset adjuvare, cum igitur occasio se obtulisset eum invitandi ejusque opera inspicendi, voti sui factus est compos. Is enim vir Ecclesiasticus vitæ integræ & probæ, laudabili ac recto intento hujus Nobilis Domini & præcipue ob respectum ejus virtutum æstimationem, quam de eo susceperat, adeo commotus fuit ut animo propenso omnia sua ipsi offerret, id quod in causa fuit ut Nobilis Dominus suum desiderium & zelum jam diu conceptum in totum applicuerit promotioni sui laudabilis propositi, quemadmodum & ad id dignum duxit mihi id notum facere, ac facultatem dare descriptionem hujus Patris Reverendi, quam susceperat, perillustrandi, sciens satis quanto etiam ego desiderio flagrare, ut propositum ejus in bonum ac commodum publicum perfectum viderem; Et certè hic labor, quem Pater nominatus in cognitione ac experientia plantarum hujus loci impenderat, non poterat non nobis materiam laudis dare eumque pro merito æstimandi, tum & illud quod & manu propria plantas pingebat celeritate adeo prompta, quæ vim ejus imaginationis ac vividæ memoriæ satis ostendebat; verum enim verò ipsa descriptio plantarum videbatur Nobili Domino ut & mihi majorem ac pleniorum perfectionem requirere, nam id omne quod in eâ erat magis concernebat vires plantarum medicas, forma autem earum ejusque partium leviter ac superficialitè exposta: ipsæ quoque figuræ minus erant perfectæ, quam ut formam omnem partium, præcipue Florum, Fructuum & Seminum exactè exprimerent. Equidem non est quod hæc dicta volumus in detractionem ejus honoris, quem vir pius & integer meretur, nam ut ipse satis confitebatur, describerat plantas hujus terræ magis velut in transitu ac in suum oblectamentum & exercitium, quam quidem cum illo proposito illas edendi: Zelus itaque quem hic Nobilis Dominus in eo viro pio conspexerat,



## PRÆFATIO AD LECTOREM.

tanto magis in eo suum accendebat zelum, addebatque animum circumspecti-  
num non pluribus ac melioribus mediis quam hic pater nominatus, succinctum per-  
fectiorem de plantis hujus loci descriptionem possit proficere, ut adeo ad majus  
commodum quod intendebat, ferviret, quod ipsis figuras concernebat, eas vide-  
bar perfici posse, quoniam ad manum essent peritissimi pictores, qui exactissime &  
ad vivum plantas possent exprimere; quod ad vires medicas etiam videbat eas au-  
geri posse, siquidem expertissimi Malabarici Doctores moti præcipue ex summo  
respectu, quem hic Nobilis Dominus hanc inter gentem Malabaricam ejusque Re-  
ges ac Principes obtiner, suam operam libentissime offerrent ad omnia quæ de iis  
ficerent communicanda; unica igitur adhuc restabat difficultas ut plantæ exactè de-  
scriberentur, ut in eo etiam major perfectio, quam non tantum nos, sed etiam  
ipse Pater Reverendus necessariam esse judicabat, haberetur. Etenim quod ad me,  
videns rectum & laudabile Nobilis hujus Domini propositum & quanto ardore ac  
animo in eo erat, ut hoc opus perfectum videret, tum in bonum publicum, tum  
& præsertim ut rebus Ordinum præpotentum India ex usu veniret, & simul in-  
telligens, quantis negotiis hic Nobilis Dominus in Regimine militari & politico  
erat prædeditus & dilentus, quo minus manum ad operam adhiberet, ut & quod  
Reverendus Pater MATTHÆUS occupationibus Ecclesiasticis, ut & ipse fateba-  
tur, summè erat detentus, neque adeo in eo proposito Nobilis Domini possit ul-  
terius satisfacere, uti & quidem optasset, reperiebam me fuscitatum ut quantum  
in me erat opis, quod propositum Nobilis Domini effectum daretur, adferrem,  
quemadmodum & illi animum meum ad id obtuli, quanquam non sine præce-  
dente protestatione mearum debiliū facultatum, quodque in cognitione plan-  
tarum ante non fuero exercitatus; hac igitur ratione placuit Nobili Domino ut  
quantum in me erat, ego efficerem, adhibuitque eos qui plantas omnes mihi de  
novo afferrent, quemadmodum & Reverendus Pater MATTHÆUS ut rectum  
Nobilis Domini propositum effectum videret, etiam communi bono gaudens li-  
bentissime ac propenso animo omnia sua in manus meas tradidit, ut ex ejus scri-  
ptis ea quæ de viribus medicis plantarum haberet, nostro operi infererem.

Quod igitur hanc descriptionem concernit, in ea expressa est forma & facies  
cujusque plantæ, earumque præcipuarum partium, ut Radicis, Stipitis seu Caulis,  
Foliorum, Florum, Fructus, Seminum, uti & proprietates coloris, præterea posita  
sunt nomina in lingua Malab. & Bramanum cum singulari eorum notatione, cu-  
re quoque nobis fuit omnes plantarum notas species, quas comparare potuimus,  
cum earum differentiis simul describere, ut ita omnem confusionem, quæ in  
plantis dignoscendis inter species facillimè oboriri potest, præveniremus; quod  
ad figuras, in illis plantæ cum præcipuis suis partibus, ut Floribus, Fructibus, Se-  
minibus in naturali magnitudine delineatæ & ad vivum expressæ sunt, idque adeo  
exactè ut non dubitem quin descriptio nostra ut ut omnibus suis numeris non sit  
absoluta, cum iis collata sufficiens erit ad claram & distinctam cognitionem de  
hisce plantis acquirendam; quod ad usus medicos, illos tum ex inventis Reveren-  
di Patris JOANNIS MATTHÆI Carmelitæ delegimus, tum ex ote Docto-  
rum peritissimorum nempe RANGA BOTTO, VINAIQUE PANDITO, &  
APU BOTTO Bramanum, & ITTI ACHUDEM hominis ex genere Chegem  
quemadmodum ex testimonio ipsorum patet; quibus additi sunt vires quorun-  
dam oleorum à nobis extractorum; atque hac ratione primam partem Horti hujus  
Malabarici adnotavimus.

JOANNES CASEARIUS,  
*Eccles. in Cochim.*

A L I A



A L I A  
P R Æ F A T I O  
A D  
L E C T O R E M.



*Cœpisti hic, amice Lector, hortum Malabaricum, in quo adornando Nobilis ac Generosus Dominus HENRICUS à RHEEDE omnem operam posuit, ut S. D. JOANNES CASEARIUS, plantarum, quas hic hortus continet, descriptioni accuratè efficiendæ unicè intentus; quod ad me, qui S. meas in eorum operâ, ut ex prioræ præfatione constat, partes habeo, gratulor mihi illos Dominos tum ex proprio zelo, tum ex mea, quam in describendi plantis operam posueram, suscitatos esse ad descriptionem exactam S. accuratam, cui ego perficiendâ ob Ecclesiastica mea munera non potui vacare, uti quidem illi Domini optabant concinnandam, tum S. maxime quod mea in plantis hisce scripta in manus horum Dominorum venerint, qui ut opus eorum esset magis absolutum, illud quod ego de viribus plantarum longâ experientiâ collegeram, ad promotionem tum boni publici, tum etiam commodi Ordinis Societatis Indica, dignati sunt suis scriptis inferere, atque adeo mea opera, quæ forsân alias obscurata, frustra-nea S. imperfecta fuissent, palam facere, in quo fidelissimè mecum eos egisse testor; Equidem quò magis antè sapius doluerim, me meorum amicorum præcipuè inter Hollandos Doctissimi D. Professoris JACOBI GOLII, cui eo magis eam devinctus quòd Reverendus Pater, Frater COELESTINUS à S. LUDOVINA, Carmelita discalceatus Ordinis S. Elia Propheta, uti S. ego, meus olim Vicarius in Monte Libano, petitionibus obnixis, quibus à me exquirebant plantarum harum cum suis*

\*\*\*

viribus

# Alia PRÆFATIO ad LECTOREM.

viribus delineationem, non potuisse prodesse, tanto magis jam animus se recreat quod meam, quam in explorandis viribus medicis plantarum operam posueram, non perdiderim. Nihil igitur mihi magis in votis est quam ut illi Domini in reliqua parte HORTI MALABARICI concinnanda constanter pergant, seque non detrectent ob laborem operis ulteriori descriptioni. Datum in Civitate Cochinesi, vigesimo die Mensis Aprilis anni millesimi sexcentissimi septuagesimi quinti.

DD<sup>mo</sup>. V<sup>ro</sup>.

Humilissimus servus in Christo

Frater MATTHÆUS à S. JOSEPH,  
Carmelici Discalceatus Cong<sup>g</sup>. Italica.



7. 10. 1917

**E**GO EMANUEL CARNEIRO, Christianus Romanus, incola Civitatis Cochinenfis, interpres juratus N. Societatis Indicæ per mandatum D. Commendatoris HENRICI à RHEEDE ex lingua Malabarica in lingua Lusitanica explicavi & interpretatus sum nomina, virtutes medicas, & proprietates arborum, plantarum, herbarum & convolvulorum nascentium in hisce terris Malabaricis, auditas à COLADDA Doctore Malabarico gentili, & Natione *Cheguo* naturali in *Carruparàm*, ac in Doctorem Malabarico-

run

rum libro scriptarum; in cujus rei fidem ha-  
ce scripsi & subscripsi. Datum in Civitate  
*Cochinensi*, vigesimo die Aprilis anni mille-  
simi, sexcentissimi, septuagesimi quinti.

MANOEL CARNEIRO.

*Traductum ex lingua Lusit. per me*

CHRISTIANUM HERMAN de DONEP,  
Secretarium Civilem Civitatis *Cochinensis*.





சுமந்திரன்

**E**GO ITTI ACHUEDEM Doct̃or Malabaricus Natione *Chengo*, gentilis & naturalis in *Carrapuram*, seu terra dicta *Coddacarpalli*, habitator ædium dictarum *Coladda*, qui proavis, avis & parentibus Medicis seu Doct̃oribus natus sum, testor me per mandatum D. Commendatoris HENRICI à RHEEDE, venisse in Civitatem *Cochinensem* & per EMANUELEM CARNEIRO Nobilis Societatis Indicæ interpretem dixisse & dictasse nomina, virtutes medicas & proprietates arborum, plantarum, herbarum &

★★★★

СОП.

convolvulorum tum scriptas & explicatas in libro nostro, tum quas diuturna experientia & exercitio observaveram; quod verò hæc explicatio & dictatio absque ullo dubio præterierit, nec ullus Doctorum Malabaricorum sit qui de veritate eorum quæ dixi dubitet, feci præsentibus quas propria manu mea scripsi & subscripsi. Datum in Civit. Cochin. 20. Aprilis 1675.

ITTI-ACHUDEM, Doctor Malabaricus.

*Transluctum ex lingua Malabarica in Lusitanicam per*

MANUELEM CARNEIRO,

*Et ex Lusitanica in Latinam per me*

CHRISTIANUM HERMAN de DONEP,  
Secretarium Civilem Civitatis Cochinenfis.



H O C

सुनिश्रीवालिवाहनविक ५५६७ रासससवसर वैत्रव ६७१० को  
 जीराजपाटणीवैसिक १५६७ त थाविनायकपंडितआपमदेवगवेध  
 तानिकोबिबाकुमदेर आडिकिफांडे त्यावानिरोपान ह्यामनबारादेवा  
 नुआविनिओप्रथमात्रहसंवालिगाडरवउ ओअखेतन्यामनुष्याकुमु  
 सारोदेहसु तेतेगांचालुपेटवूनतिनिबोसवदआणबूनत्यात्यागांडावैफस  
 फूलपातवीरसमसा त्यामुत्तुकावावरिसपादूनतितीविनिरीत्याउप  
 रांतआमिआमगेन्यावेद्यत्रैथवाचिचैरापुंमाणीत्यांत्याओषधचेगुण  
 वाअनुज्ञानुज्ञागुणआमकाकळेलेगोवात्याआखदांवीनावपळेउतु  
 आनिदानिवर्धमकाजिसाजेआमिनागिनाबूनहाविबुसपादूनदिलातेल  
 टिकअत्रियाणुचाकनअअविद्याणुआमिआमचीतिसाणिकर्णदिली  
 तेसत्यदाणुमातुवैजाइददाणुतागरबग्यानहूबरवुतुदिली. श्री-

१५६७

विनायकपंडित

आपमदेव

# H O C E S T.

**A**B anno millesimo quingentesimo nonagesimo septimo dicto  
 à Bramanis Palivanapaco (qui apud nos est annus 1674:) us-  
 que ad decimum Aprilis anni dicti Requesno (qui apud nos est  
 Annus 1675.) Ego RANGA BOTTO, VINAIQUE PANDITO  
 & APU BOTTO, omnes tres de Natione & Religione Bramanas  
 & Gymnosophistæ antiqui in districtu Cochinenfi per mandatum No-  
 bilis D. HENRICI à RHEEDE, Commendatoris terrarum Ma-  
 labaricarum & Civitatis Cochinenfis, curavimus per servos nostros qui  
 notitiam arborum, plantarum, herbarum & convolvulorum habe-  
 bant, eas ex terra Malabarica cum suis floribus, fructibus & semi-  
 nibus ad Civitatem prædictam, ut delinearentur & describerentur,  
 adferri, quarum nomina scripta sunt in libro nostro vocato *Manha-  
 ningastnam*, in quo etiam continentur virtutes & vires earum Medi-  
 cinales, & præter hæc eis addidimus quod diuturna nostra expe-  
 rientia & magno labore ac sudore de iis didicimus & observavimus,

\*\*\*\*\* 2

& ut



& ut hic liber perficeretur, laboravimus per spatium duorum ferme annorum, ita ut omnis & quilibet, qui eum lecturus & visurus est, ei possit adhibere fidem quam ipse fuisset daturus, si res in ea scriptas ipsemet fuisset expertus; juramus itaque secundum consuetudinem nostram, quod omne in eo contentum verum sit: in cujus rei fidem fecimus presentes chartas quas propriis manibus nostris subscripsimus. Datum in Civitate *Cochinensi* vigesimo die Aprilis anni millesimi sexcentissimi septuagesimi quinti.

RANGA-BOTTO, VINAIQUE PANDITO,  
A P U B O T T O .

*Traductum ex lingua Dramanum per subscriptum*

VINAIQUE PANDITO

*in linguam Lusitanicam, & ex lingua Lusitanica  
in Latinam per me*

CHRISTIANUM HERMAN de DONEP,  
Secretarium Civilem Civitatis *Cochinensis*.



A R-

ARNOLDUS SYEN  
CANDIDO  
LECTORI  
BOTANOPHILO

S A L U T E M.

**P**AUCIS in ipso limine monitum te volo, Amice Lector, quid in hoc opere à me sit præstitum. Cum anno elapso, obiter illud perlustrare contingeret, mox arrisit laudabile Autorum institutum, non dispari successu ad metam perductum. Præter enim figuras splendidissimas, & tam affabre delineatas, ut vix ovum ovo magis simile esse, ex siccatis quas plerasque penes me asservopantis, asserere ausim: accuratissimam Plantarum Anatomen, diffusa exhibet descriptio, quæ non singulas duntaxat ipsarum partes, sed & partium minutias exhibet. Huic enim operi exornando, plerique tractus Malabarici Reges, sua contulere auxilia, & intimos remotissimisque Regni recessus, Optimatum & Medicorum suorum auspiciis perlustrare jusserunt. Videbatur tamen deesse hujus operis, cum reliquis

\*\*\*\*\*

auto-

## AD LECTOREM.

*autoribus qui consimiles tractârunt materias, nexus & consensus : vel ut distinctiùs loquar, notulæ quædam, quibus indicaretur, quænam plantæ jam ab aliis fuissent exhibitæ, & recepto nomine donatæ, & quænam de novo in scenam prodirent Botanicam. Hoc opus amicorum suâsu, lubens arripui, simulque plantas antea non descriptas, quantum ex autorum descriptione, & Iconibus licuit, BAUHINIANIS denominationibus insignivi. Quo fato, judicent æqui rerum æstimatores. Interim vale, & ipsum Hortum ingredi.*



P A R S



*Tenga* Latina.  
 ४ ६३ *Malabarica.*  
 قندل *Arabica.*  
 मातु *Lingul Bramaica*  
 ३ *antiqua*



Fig 1.



*Amor Jacch Godhart Delincent.*

*B. Surpoudal fecit.*









*Tenga. Lat.*  
 தெங். மல. *mal.*  
 تنج. Arab.  
 मृ३ *brah.*






F. 2.












*Tenga*. *Latina*  
 കൊങ്ങി *Malabarica*.  
 தேங்கை *Arabis*  
 माड़ू *Lagrus hirsuta*












Tenga. lat.

১৩৩৩ mal.

طنجاء Arab.

माङ्ग bran.





PARS PRIMA  
H O R T I  
MALABARICI  
D E  
A R B O R I B U S.  
T E N G A.

F I G. 1. 2. 3. 4.



*Tenga*, lingua Bramanum *Madô*, est arbor cum sur- Fig. 1.  
recto caudice alte assurgens, nasciturque in are-  
nosis.

*Radix* crassa cortice rufescente ac nigricante, in-  
terius ligno molliori, fibras late transversum dif-  
fundens.

*Caudex* surrectus unum pedem crassus, in una parte crassitie ma-  
xima duos ferme pedes æquans, ramis foliaceis qui ex solo ejus ver-  
tice altius ac altius increfcente erumpunt coronatim ordine decus-  
sato in summitate circumdatus, ac in cortice seu crusta nigricante,  
quæ deglubi nequit, scmiannularibus circulis ac notis quibus pedes  
ramorum infederunt striatus; constatque ligno minus duro ac filamen-  
tis grossis pertexto ac ruffo-rubefcente, intus molliori, ad corticem du-  
riori, cum vetustior est multò duriore & magis nigricante, quod sub  
dio expositum intra duos, tresve annos corruptioni obnoxium, sub  
aquis magis durabili, ejus cacumen, quod à teneris ramis circum-  
datur, cum altior ac vetustior est, in conum fastigiatur ac molli &  
albicante pulpa seu corculo dicto in lingua Lusitanica *Palmita*, quod  
exterius ex variis tunicis sibi mutuò superinjectis conflatur, ac intus  
densum est, constat; hoc cum tenerior est *Tenga* & altitudine  
unius cubiti, est dulcis ac grati saporis; cum majoris ætatis, saporis  
minus grati ac astringentis ac dulcedine nulla; cum altior ac vetu-  
stior est, saporis dulcioris & gratissimi, æmulans juglandes nostra-  
res, estque in eduliis ac ab elephantibus maxime expetitur, qui ob  
ejus appetitum arbores hæcè cradicant.

A

*Rami*

*Rami foliacei* simplices sunt, in nullos alios divisi, in pede quo caudicem primum arctè complectuntur interius plani, ac nonnihil concavi ac supernè interius in ventrem acutum extenuati, exterius in totum convexi, in imâ parte pedis latiores & inde sensim in angustum contracti ac in oris extenuati, & reticulato, raro, ruffo-fusco cortice, cujus filamenta ex oris pedis utrinque prodeunt caudicem primum circumvestientes ac se mutuo obtegentes; suntque vestiti cortice flavo viridi ac intus filamentis lignosis minus duris mollem inter carnem albicantem pertextis constantes: qui vetustiores sunt à caudice magis deflectunt ac pandi sunt, dein decidunt alter post alterum temporibus ordinatis, dum alii ex summitate caudicis de novo erumpunt.

*Folia*, quæ superiorem partem ramorum circumvestiunt ad partem eorum planam ubi in ventrem extenuati sunt, utrinque in oris prodeunt obliquè ex adverso sita, suntque oblongo-angusta longitudine plus minus sesquicubiti, latitudine trium transversorum digitorum ab origine sensim in angustum contracta, superficie valde plana, venis parallelis ac subtilibus in longum striata inferius cum futura albicante subflava quæ in angulum inflexa est, inserta sunt, ac versus exteriorem partem ex angulo futuræ nonnihil clausa, & in interiori, quæ cum interiori superficie rami convenit, costa altè eminente, quæ exteriorem partem sulco striat, in medio obfita, viridis fusci & nitentis, cum marcescunt, flavescente, saporis & odoris nullius nisi sylvestris.

Fig. 1. *Supra ex Ramorum Foliaceorum exortu ex Caudice oriuntur Capsæ* oblongæ in quibus *Flores & Fructus* teneri simul inclusi sunt furculis insidentes; sunt autem capsæ rotundæ & nonnihil planæ, tres quatuorve spithamas longæ, ad originem angustiores & flaviores, & in vertice in conum stricti medii digiti latitudine ferme in cortice crassæ venis filamentisque lignosis in longum striatæ, exterius virides ac sulcis linisque quæ ad cacumen profundiores, exarata, interius albicantes & glabræ.

*Surculi Fructiferi* dum in capsâ inclusi sunt glabri & nitentes ad originem glandulosi, angulati & undulantibus lacunis inflexi, alii rectius, alii ductu parum serpentino excurrentes medio ramo crassiori coronatim circumpositi, & versus cuspidem capsæ in angustum contracti, denso ordine ad se mutuo arctè consiti ac rupta capsâ ex medio ramo se transversim in orbem expandunt, suntque vestiti cortice crassiole, primum cum molles ac teneri & in capsâ inclusi subflavi & flavo-albescentes ac dein magis flavescentes ac rubescentes, post viridescentes; in hisce *Surculis* in *Capsâ Flores & Fructus* ex ordine proveniunt, ut *Fructus* in inferioribus partibus prodeant quam *Gemma Florum*.

Gem-

*Gemma Florum* spicæ sunt albescentes parum flavæ ac dein magis & magis flavescentes, glabræ & nitentes, aliæ planiores, aliæ rotundiores parvis & flavo-albicanibus calycibus trifoliatis arcte exceptæ cum in capsis sunt densè ad se invicem conficæ, ubi autem extra capsam cum sutculis erupere iis accrescentibus rariotes ac transversum sitæ vel parum anteriora versus cum cuspidè reflexæ, aperiuntque se in tria folia, quæ ad unam otam rotundiora sunt, & in vertice cuspidata, duriola, rigida & crassiola, habentque in medio sex stamina flava, quæ oblongis, crassiolis primum surrectis, dein decumbentibus apicibus dotata sunt, ac ex unguiculis foliorum prodeunt, ac cum iis stylum brevem, crassiolum & albicantem, superne trifidum, suntque odore grato, velut lilia, licet debili: *Flores* postquam è *Capsis* erupetunt, confestim è *Surculis* decidunt.

*Fructus* qui cum *Floribus* in capsis oblongis simul proveniunt, & <sup>Fig. 4</sup> infra *Flores* *Surculis* arcte insident, cum ad maturitatem pervenerunt, prægrandes sunt, suntque velut nuces constantes operimento lignoso, qui interius ad superficiem interiorem operimenti seu testæ medulla alba obducti sunt, ac intus larga cavitate quæ aqua seu liquore repleta est: hi dum teneri sunt & ex capsâ cum spicis erumpunt, forma rotundi sunt colore flavo-albicanter & calyce flavo-albicante, qui ex rotundis foliis mutuò circumvolutis constat, arctè & in totum obducti, intus sub corticibus quibus circumteguntur carne densa albicante, nulla cavitate dotati, postmodum verò cum ætate incrementum forma oblongo-angusta sunt in longitudine maxime aucti, minus verò in latum, in cortice exterius cum nitore viridescentes, calycis foliis ex quibus cum superna parte emicant ex rufo rubescentibus, proditque se in iis primum nota parva, oblongo-angusta, cavitatis cum majori incremento introducendæ in ima parte seu ad exortum fructus, antequam autem cavitatis se offert, fructus hi teneti Malabaribus *Bellacâ*, Lusitanis *Coquinhas*, cavitate autem jam introducta *Fructus* primum sola aqua repleti sunt ac tum dicti Malabaribus *Caricâ*, Lusitanis *Caricâ*; absoluto verò cavitatis incremento postquam omni sua repleti aqua sunt medulla ad interiorem operimenti superficiem obducuntur.

Quod ad cavitatem notandum, eam in teneris fructibus valde <sup>Fig. 3</sup> oblongo-angustam esse ac cum fructibus primùm in longitudinem magis incrementum; minus verò in latum, esseque circumscriptam forma ovali, cujus angulus acutior versus summam fructus situs est, in fructibus autem vetustioribus ad formam ellipticam seu rotundam accedere: est autem medulla *Fructus*, quæ ad certum temporis intervallum augetur expetita in eduliis, primùm tenera & albicans ac subcerulea, sapore dulci ac grato, minimè verò oleoso, dein albicans ac magis magisque indurefcens, cum dura sapore nuci, ac

quo vetustior seu durior saporis magis oleosi, contrita ac tusa lacteum liquorem, qui & sapore lactis est, sed nonnihil oleosi fundens; cum vetustissima est maximè oleosa ac ex oleo coarulescens, odorem fetorem oleosum, qui ingratus est, spirans; pro diversa medullæ consistentia *Fructus* variis nominibus sunt donati, cum ea tenera est & lacti similis ac mollis, dicitur Malabaribus *Corumba*, cum completa est & non magis augetur, *Elani*, Lusitanis *Lania*; cum nonnihil dura est Malab. ut & Lusitanis: *Malinga*; cum dura est, *Tenga*, Lusitanis *Côquo*, cum adhuc durior, *Barétu-Tenga*, ac cum maximè dura, *Côta-Tenga*, Lusitanis *Côco Sicco*. Quod ad aquam, quæ est intra cavitatem, hæc in fructu tenero *Caricu* dicto est primum subastringens, subfalsa & subacida, minus verò dulcis, dein quo fructus vetustior fit, magis & magis dulcescens; in fructu vetusto, ut *Barétu-Tenga*, simul valde dulcis & falsa, ante medullæ proventum clara & valde limpida est instar aquæ; medulla autem proveniente turbida seu minus limpida & pallide albicans; ex fructu *Caricu*, qui omni sua aqua jam repletus est, facto angusto foraminulo per operculum magna vi radiatim exsilit, minus verò ex fructu, qui medulla repletus est, ut *Corumba* seu *Lania*; aqua in *Maninga* id proprium habet, quod ut liquor, dictus *Suri*, fermentatione ad oculum notabili cietur, cum medulla dura est in fructu exsicari incipit, in ollam infusa & aëri exposita saporem dulcem illico amittit & subacida redditur, idque ocysus si vento moveatur, sine ulla tamen fermentatione, quin & aqua fructus *Maninga* hoc modo omnem suam fermentationem amittit. Quod ad operimentum aquam ac medullam continens, illud primum tenerum, estque in fructu *Corumba* adhuc molle & esculentum ac sapore nucis juglandis, illud calce illitum primum flavescit, dein viridi-fusco colore tingitur, quò vetustior fit fructus ac medulla durior etiam magis indurefcit, ac cum maxima duritie est, sectioni minus pervium, estque exterius tribus futuris eminentibus in longum striatum, ac in parte inferiori inter futuras tribus oculis clausis donatum, quorum unus latior & minus durus est, inter futuras, quæ latius distant, situs, aurificibus ob ferventem flammam, quam exhibet, in usu. Cortex exterior operimentum obducens in exteriori superficie primum est albicans, ut in fructibus de *Coquinbos* cum tenerimi sunt, dein viridescens, ac cum majori ætate ex viridi flavescent, cum autem fructus vetustior est ac exsicari incipit, estque tandem siccus cinereo-fuscus, & primum quidem mollis ac tenuis est, dein constans intus carne densa, albicante & molli, quæ in *Lania* tenera adhuc mollis & sectioni facile pervia est, ac calce illita flavo colore tingitur, post magis & magis indurefcens intus in carne plurimis lignosis ac stupeis filamentis ad funiculos conficiendos idoneis quæ operimento ligno-

lignoso exterius arcè adhaerent, est intertextus. Quod ad formam extetnam, hi fructus cum tenerrimi, rotundi sunt, cum majori ætate oblongo-rotundi ac tribus angulis obtusis ad partes furutarum emicantes, cum vetustiores sunt minus oblongi, ac cum vetustissimi sunt, figura magis contracta quàm *Lania*; in cocos vetustis ad partem eorum inferiorem intra medullam duram oculus oblongo-rotundus albicans, qui postea flavescit, se prodit, estque tenerum germen fructus qui eo terræ mandato ex superiori parte per oculum operimenti minus durum seu latius furculum novellum extrudir, atque ex infema parte piram dictam Mal. .... Lusitanis *Pongo*, quæ magis & magis increscens dum aqua interea exsiccatur, totam cavitatem adimplet; furculus autem novellus ex oculo prodians extra operimentum emicans paulo reflexus corticem exteriorem perterebrat, ac ex inferiori parte emittit radículas, quæ per corticem exteriorem primum obliquè decurrendo, tandem eo perrupto se tertæ hinc inde affigunt: pirum quod in cavitare nascitur albicans est, & in strictiori parte, quæ ex oculo prodit subflavum, exterius rugis in longum striatum & granulatum ac oleo inunctum, inrus fungolum, humidum, molle & albicans, esculentum, sapore multo dulciori quàm medulla, verùm nonnihil fastidioso.

Ex hac arbore liquor *Suri* quoque provenit, qui potus est ut vinum vim inebriandi obtinens, sapotis grati, subdulcis, subfalsi & subacidi, cum primum exceptus est majori dulcedine, cum vetustior acidior, coloris ex albicante subcerulei & pallidi, in superficiei bullis seu spuma obsitus ac brevi tempore fermentans ac inter fermentandum sibilum edens ac guttulas tenues veluti vinum forte & vegetum in aërem excutens, vi quoque massam farinaceam seu cerevisiam fermentandi pollens maximè cum dulciot est, estque liquor maximo commodo serviens, ex quo vinum ardens, quod ut vinum vim inebriandi habet, acetum ac saccharum quod *Iagra* vocant, formatur; educitur autem hic liquor ab iis quos *Chegues* vocant hoc modo: capsæ floriferae seu fructiferae, quam *Mammam* arboris vocant, cuspidem incidunt, eique ollam appendent, ac infra cuspidem intervallo quatuor digitorum corticem capsæ obliquè secant, sectumque versus cuspidem elevant barbam ut ajunt efficientes, ut liquor ex cusptide inciso per corticem capsæ dimanans ex barba in ollam appensam refundatur, cuspidem autem incisum vel limo certo obducunt, vel foliis *Vetti-Tali*, vel corticis exterioris viridi rasura idque ad obturandum cavernulas in cusptide fitas, ne per eas liquor *Suri* ex furculis, qui intra capsam sunt, exstillans, intra ipsam capsam se effundat: capsam quoque vinciunt in incisura cum cortice qui à ramis foliaceis detactus est ad impediendum ne rumpatur; *Mamma* autem seu capsæ cusptide primum inciso post quinque dies

B

dat



dat *Suri*, estque is liquor qui primum exstillat colore rubescente; bis de die mane & vesperi ex communi usu ollas cum *Suri* detrahunt; cum tribus vicibus, etiam meridie; ollæ priusquam appenduntur, primum bene tersæ sunt ac ab omni liquore expurgatæ, quoties autem appenduntur, cuspis inciditur & prædicto modo oblinitur, ac insuper *Mamma* in quatuor partibus proximè ad oras, non verò in ipsis oris, neque in medio inter duas oras pulsatur cum osse butyro repleto, fit autem illa pulsatio ne liquor intercipiatur ac hæreat, sed faciliùs ac liberiùs, atque adeo copiosius manet; liquor hic *Suri* dictus, qui medio die detrahitur in ollis mane appensis, dulcis est, qui vesperâ subacidus, altero die acescens, tertio autem die liquor dulcis acidus redditur, suam dulcedinem prorsus amittens; liquor qui ex arbore tenera educitur minus fortis ac vegetus est quàm qui ex arbore grandiori & vetustiori, minùsque spirituofus, adeò ut minus vini ardentis per distillationem exhibeat, odoremque terræ in qua nascitur etiam spirans; liquor quem arbores valde vetustæ dant, minori copia emanat & dulcior est ac magis inebrians; vinum ardens ex hoc liquore postquam uno die in ollis detractis servatus est, destillando extrahitur additis nonnullis guttulis olei de *Cocas*; ut acetum ex eo conficiant, ollas in quibus exceptus est, in calce per quindecim dies imponunt, quo ad fermentationem vehementem excitatus multam spumam ebulliendo ac in fundum ollæ materiam albicantem, quæ coloris cinerei est, demittendo, mutatur in acetum; Saccharum autem *lagra* dictum ex eo liquore hoc modo conficitur; ollis quas *Mammis* arboris appendunt, indunt momentum calcis quantum sufficit ad liquorem instillatum rubedine tingendum, nam si calx superflua sit liquor est magis albicans & lacteus colore calcis, si minus calcis additum, liquor ex suo colore albicat, dein hunc liquorem *Suri* ita cum calce sufficienter imbutum & permixtum, coquunt, continuò eum cum cochleari movendo donec inspissetur, habeturque tum saccharum rubrum; notandum verò ex liquore *Suri* instillato, cui minus calcis datum est, non posse saccharum confici, si verò plus calcis ei datum sit, adeò ut in fundo impermixta resideat ad saccharum conficiendum residuum calcis primum esse demendum; in confectiione sacchari seu *lagra* albicantis hoc insuper observatur quod liquorem *Suri* cum calce permixtum in ollas diversas ad separationem calcis transfundant, mutando ter ollas, ut si mane detractus sit, medio die calce quæ in fundo subsedit relictâ, in novam ollam infunditur, atque ita altera vice hora secunda, ac vespera rursus in novam ollam refusa coquitur.

Hæc arbor valde ferax est, præcipue quæ in locis salis ac proximè ad mare nascitur, quæ in montosis provenit minùs ferax est, ac fructus seu *Cocas* minores dat, quorum aqua saporis est minus dulcis ac minus grati, liquorem *Suri* minori quoque copia fundit, qui ta-

men

men fortior est; à vigesimo quinto ad trigessimum ætatis annum vigore est summo, fructus seu *Cocos* abundantiores & grandiores uti & capsas seu *Mammas* in quibus inclusi sunt majores producents, ac liquorem *Suri* uberius fundens, ab eo tempore quo fructus dat, maturis deciduis novos semper dat fructus, licet cum longævæ ætatis sit, minori copia & forma minores; liquor *Suri*, quem vetustior dat, minori quoque copia exstillat; verum dulcior & fortior est; centum annos ordinariè durat in vita; cum languet ac morti proxima est, rami omnes foliosi flavescentes ac velut adusti conspiciuntur.

Observatum est de hac arbore eam tertio post sationem anno ramis, qui in justam magnitudinem excrevere, vestitam esse, atque ab eo tempore ramos incipere decidere, suntque tum rami ad sesquihominis vel etiam duorum altitudinem surrecti, & caudex qui ramis in totum circumvestitus ac obtectus est non major quàm altitudine unius cubiti, crassitie autem unum pedem æquans: singulis mensibus ordinariè unus ramus novus prodit, veteribus interea deciduis, estque tempore æstivo lapsus ramorum frequentior quàm pluvioso, spatio trium mensium rami in justam magnitudinem excrescunt, puta qui post tertium annum à satione in arbore proveniunt; ante exitum capsarum seu *Mammarum* fructiferarum rami majore longitudine sunt quàm post, in arbore grandi ordinariè viginti octo rami plus minus conspiciuntur; capsas cum suis fructibus quandoque tertio à satione anno, vel quinto, vel octavo, vel decimo producent, prout terra magis vel minus bona est: capsæ infra singulos septem ramos qui è summitate arboris prodeunt, proveniunt spatio trium mensium in suam justam magnitudinem excrecentes, seseque decimo quinto die post aperientes; flores quinto vel sexto die post capsarum aperturam decidunt; in arbore ordinariè sunt duodecim fasciæ *Cocorum*, una fascia fert *Cocos Siccas* dictos: *Barattu-Tenga*, seu *Cotta-Tenga*; altera fructus maturos dictos *Palupèn-Tenga*, qui carne magis dura sunt quam *Maninga*, minus verò quam *Tenga*; tertia fructus immaturos, dictos *Belacà-Caricu*; quarta fructus dictos *Maninga*; quinta fructus dictos *Elani*; sexta fructus dictos *Curimba*; præterea duæ *Mamma* apertæ & quatuor clausæ; Ex fructibus teneris & ex *Mamma* primùm erumpentibus ordinariè quindecim aut sedecim è ramis decidunt, reliquis in *Cocos* excrecentibus; tertio post aperturam *Mammæ* mense fructus aquæ pauxillum acquirunt, sexto autem mense omni aqua sunt repleti; dein spatio trium mensium omni sua medulla implentur, quæ post tres menses indurefcit ac tum cocus ex arbore decidit, uno autem mense ante elapsum aqua diminuitur ac tum etiam oculus in medulla se offert: fructu deciduo post unum mensem se prodit pyrum quod spatio sex mensium totam cavitatem replet, intra quod tempus si terræ mandatus

fit *Cocui*, ex oculo furculus cum ramis novellis ad altitudinem unius cubiti assurgit.

## V I R E S E J U S.

**R** *Adix* decocta in aqua & cum sicco gingibere epota confert pro febre calida, eadem trita & decocta cum oleo fructus seu *Coqui* adhibetur in ablutione oris pro pustulis in gingiva obortis; succus ex ramis tenellis expressus & mixtus cum momento mellis oculis ad sedandum dolorem adhibetur facta lotionem, succus foliorum cum oleo fructus seu *Coqui* in decocto datus proficiuus est pro hæmorrhoidibus; flores cum saccharo comesti juvant urinantes materiam purulentam; succus ex floribus expressus ac in lacte vaccæ datus proficiuus est pro gonorrhœa; capsula florum trita & cum oleo decocta prodest in ulceribus ex adustione oris facta perunctione, succus ex fructu tenello expressus servit pro pustulis oris in infantibus facta lotionem, ut & pro oculorum doloribus eodem modo adhibita; aqua *Canje* epota cum floribus ardori jecoris restinguendo confert, eadem in iterata lotionem capitis pro rubedine oculorum conducit; medulla fructus seu *Coqui* valet pro sulcis oris masticata; oleum ex medulla extractum pustulas capitis pellit facta perunctione, idem proficiuum quoque est pro hæmorrhoidibus eodem modo usurpatum; pyrum quod ex aqua in cavitate *Coqui* excrescit cum oryza tostum datur pro tussi ex melancholia nata, ex cortice arboris exprimitur oleum quocum ungitur pars affecta morbo cutaneo nato ex vermibus.

## F I G. 1. 2. 3. 4.

*Palmarum* varii inventi species, vel mediocriter in Botanico exercitio factis est notum. *C. Baobab* in *Powers* quadrangula specie præcipue, & hanc quidem primam recensit, inter *Palmas* Nuclei ferentes, nominat *Palma Indica Canifera angulosa*, *Lenfat Indi*, id est, *Nucis Indicae Arceutha*.

Cum autem in plerisque tam Orientalis quam Occidentalis Indis regionibus, præsertim locis maritimis, copiose germinet, hunc palmam ejus historiæ pluribus tradunt auctores: & imprimis præ aliis *Gervasio ab Horto*, & in eam *Clasius*. Vires quoque & usus foliorum præstat *Hernandez* & *Rochus*, *Plantarum Americanarum historia libere tertio*, ubi ab incolis abscotum hanc *Ceylæ* vocari affirmant, diversisque ejus in nova Hispania observari species.

Accuratissimam autem hujus arboris, ejusque attributorum descriptionem, si quis insuper desideret, adest co-

leberissimi *G. Pylæi Historiam naturalem Indici*, qui testatur ab incolis *Brasilianis* vocari *Imagaga paibo*, & singula folia, pedes circiter fœdorem esse longa: à quo tamen non distantur Auctores nostri, dum ex duarum sesquicubiti æquare siliunt: cum illud quod Auctores nostri raram vocent, à *Pylæo* solum, & illud quod ab Auctoribus solum, ab ipso foliorum ala excipietur.

Præter autem variorum usus, ab aliis memoratos, quos haurimus in commodum suppeditat hæc *Palma*, resinas quoque fundit peculiarem, qualis mihi hoc usque ex *Zelon* laudatissima totius orbis insula, aliata: consistit ex farmentis medium digitum lata, & siniculi in modum in longum porrecta, coloris subfusi & pellucidi, saporis autem leni & præpinguis: quatinus verb obtineat vires & facultates, addicere aut experiri nondum licuit.

CAUN.





Caunga. L.  
காங்கு  
சாங்கு  
சாங்கு





sp. Sav.  
 Mal.  
 Arab.  
 Bram.











Caunga. lar.  
 കളി mal.  
 قنقار Arab.  
 माङ्ग bram.











Caunga. lata.  
 കിളി Mal.  
 قنقأ Arab.  
 माडि Can. ant. bram.











Paunga. Lat.  
 കിളി Mal.  
 فاكهه Lat.  
 മാരി Bram.





## C A U N G A.

FIG. 5. 6. 7. 8.



*Aunga*, Ling. Bram. *Madi*, est arbor procerâ altitudine arboris *Tenga* æquans, nascens in arenosis. Fig. 5.

*Radix* nigricans, oblonga, crassitie unius spithamæ, radículas albicantes & rufas, quæ intus lignoso filamento sunt, ex se diffundens.

*Caudex* crassitie unius spithamæ, maxima crassitie ad radicem, in summitate paulo minori obductus cortice viridi-claro.

*Rami* qui ex caudice ordinatè prodeunt, ac ordine decussato bini & bini ex se mutuo emergunt cum pede summitatem caudicis instar vaginæ seu capsæ rotundæ ac clausæ circumplectentes, exterioribus interiores circumdantibus, ac simul caput oblongum in summitate *Cauunga*, quod crassius est ipso corpore caudicis inferiore, constitutibus, rami exteriores pede fisso ac rupto post successive suo tempore decidunt, est autem pes ramorum exterius viridi-fulcus, in interiori superficie albicans, contextura ferme coriaceus, ac interiori superficie striatus, intus lignosis filamentis minus duris in longum perductus membrana candida & nitente, quæ firmæ & densæ texturæ est, obductus: pars ramorum superior quæ ex pede exit, inferius ad pedem latior est, dein sensim strictior, exterius rotunda, interius nonnihil cava ac superiora versus interius in medio in costam acutam extuberans ac utrinque ad costam planis oris circumscripta, in quibus foliis ex adverso oppositis est vestita exterius ut & interius colore viridi, ad pedem autem interius nonnihil flavescens, ac intus lignosis mollibus filamentis ac fungosis carnis fibris per-texta: sunt autem folia oblongo-angusta longitudine trium quatuorve pedum & latitudine quatuor pollicum plus minus, ac instar flabellorum in duas tresve, etiam quatuor quinqueve plicas complicata & cum plicis ex oris ramorum producta in parte interiori in plicarum angulis eminentibus costis viridi-claris obsita, & intus venis in longum striata, contextura rigida, superficie plana; viridi-fulca & nitentia in utraque parte.

In *Capitulo Cauunga* quod in summitate est intra pedes ramorum foliaceorum vaginiformes *Capsæ* in quibus fasciæ ramorum ac furculorum cum floribus & fructibus includuntur, proveniunt infra singulos una, sunt autem capsæ oblongæ quatuor plus minus spithamas æquantes in una parte, qua pedi exteriori accumbunt rotundæ, in altera qua pedem interiorem complectuntur, cavi ambitus, superficie glabra & æquabili, ad summitatem in medio partis cavæ stria lacunosa in cuius tractu rumpunt sulcata, colore exterius primum viridi-diluto albicante & subflavescente, post cum ætate flavescens, interius coloris candidi, capsæ exteriori accrescente ramus exterior, qui eum arcuè includit, vi detruditur, fasciæ ramorum & furculorum quæ in capsis inclusæ constant uno pede plano quo caudicis summitati circumpositæ, suntque in ramulis crassioribus fructibus teneris dotata, & in furculis tenuibus, qui infra exortum fructuum erumpunt, spicis folis seu gemmis florum in duabus oppositis partibus obductæ; fasciæ autem hæ in ramis ac furculis primum sunt albicantes seu flavo-albicantes, dein viridescens, cum vetustiores sunt, colore viridi-fulco & duræ.

*Spice Florum* summitati furculorum obversæ sunt, suntque parvæ & angulatæ & Fig. 6.

C

albi-

albicantes, in tria folia rigida & cuspidata ac crassiola se aperientes, continentque in medio stamina novem albicantia tenuia sine ullis apicibus, tria longiora ex flavo albicantia, quæ à sex minoribus magis flavis cinguntur.

Fig. 8. *Fructus* qui fasciis ramorum adherent cum sua magnitudine iustâ sunt, oblongo-rotundi sunt, in ima & superiori parte strictiores, involuti cortice exteriori crasso, ac constantes pulpa rufo-rubescente, & intus in medio pulpæ medulla albicante, cum autem teneri sunt, hi fructus caudidi sunt ac nientes, albicanibus surculis appendentes, forma non rotunda sed angulata, maxima parte foliis calycis oblongo-rotundioli & mutuo circumvolutis circumprehensa, interiùs constantes pulpa densa albicante, quæ saporis nullius & altringentis; postea cum ætate pulpa molli sunt & pauca continent in medio pulpæ humorem clarum ac multum qui cum pulpa altringentis saporis est, suntque tum dicti *Tamni-Painâ*, dein pulpa interiori magis aucta sunt, ac nullum humorem in medio continent, suntque tum fructus dicti, *Schalembo-Painâ*, cum ætate majori pulpa magis & magis indurefcit nasciturque in medio in longitudine medulla albicans, diciturque, cum pulpa & medulla minus dura est, *Aria-Dicca*, cum durior *Adicca*, cum maximè dura est & cortex aureo-flavus, *Palica*; est autem pulpa, forma primum ovali habens cuspidem acutiorem ad summitatem fructus, est verò pulpa, cum tenera & humida est, colore albicante-subflavo, forma oblonga & angusta & ad summitatem cuspidata, dura, colore ex rufo-rubescente, forma est minus oblonga ac crassior ac magis ad conum accedens, cujus basis est in ima parte fructus: pulpa, seu dura, seu mollis, cum *Bétel* addito momento calcis manditur, maximè autem mollis; Cortex pulpam circumdans corticula exteriori densiori & duriori, quæ superficie plana & glabra est, ac primum albicans, dein viridis, post cum pulpa ac medulla dura est, aureo-flavi coloris, obductus, intus constans carne primum tenera albicante, quæ majori quantitate est ad imam partem fructus, ac corticula exteriori decisa cum pulpa fructus in comestione *Bétel* simul manditur, cum fructus vetustior est, filamentis lignosis, quæ primum coloris albicantis sunt, dein cum corticula exterior aureo-flava est, coloris quoque aureo-flavi seu crocei sunt, est peritextus, estque tum adeo arcte pulpæ superficiei adherens, ut non facile deglubi possit: intra medullam albicantem in basi fructus in medio oculus rotundioli albicans conspicitur, qui germen fructus est surculum edens: quatuor *Capse* plus minus simul in eadem arbore in *Capitulo* reperiuntur; quinto anno à satione dat *Fructus* si terra ferax sit, ordinariè sepeimo, vivit quinquaginta annos, triginta vegeta est fructus proferens, post languescit, fructus post unum mensem, quo ex capsâ erupère, aquam recipiunt, post tres menses fructus omni aqua repleti sunt, post sex menses pulpa dura.

## V I R E S E J U S.

**R** *Adix* decocta in aqua servit pro ore sulcato si cum ea diluatur, uti & pro ejus pustulis. Succus foliorum tenerorum expressus ac cum oleo *Schirgelim* datus confert pro lumbricis.

## F I G. 5. 6 7. 8.

Arbor hæc à *C. Brebis* in *Pinar* vocatur *Palmæ*, cujus fructus silium *Fusel* dicitur, *Fusel Serapiam*, *Fusel de Pafel Abouvenne*. Fructus tum alibi, tum in Regno *Macedon* à nobilissimis vocatur *Aria*, velis *Garnat* ad *Berit*, ad quem plura de hac materia desideras cum loco tuo remitto. Ut & *Chrysophorum* à *Casse*, qui *Ardene Indica* vocant fructus deicribit, eoque adhuc viventes, sub æreâ conditi testatur, ut gustu evadant generiores, quæ & in locis nostris vultuantes magni esse usûs. Maximum su-

tem huius fructus siliam concillavit quondam *ejus* cum siliis *Batra* live *Betle*, apud Indos *Magma* & *divineas* usûs, ut apud jam citatos auctores, *Lingdotes* & *Brasim* (qui *Pyragi de Siri* & *Siri* vocat) videre est.

Plures autem *ejus* dari species, testatur præter Auctores nostros, fructus magnitudine & forma variâ, quos inter rarioris assero. Verum quem formâ oblongâ *Aria* sustinet *Cyfes*, toto coelo ab ei differt, cum nihil aliud sit, quam Nucleus interior *Palmopini* *Labeli*.

C A.



*Carim-pani. lat.*  
 കരിമ്പന. *mal.*  
 ്രളങ്കിട. *Arab*  
 നമലമ്പു *bram*









## CARIM-PANA.

FIG. 9.



*Arim-Panà* duæ species sunt, *Carim-Panà* & *Fig. 9. Ampana*.

*Carim-Panà* Bramanis *Talatâmado* Lusitan. *Palmeira Brava* fcm. est arbor procera nascens in arenosis.

*Radix* supemè capillata, ac infernè ramum medium crassiotem rectà demittens, ac cum eo ramos transversos tenuiores, estque cortice ac ligno nigricante.

*Caudex* ligno rufo-nigricante, in medio cortulo molli, exterius cortice seu crusta nigricante, quæ deglubi nequit, ut *Tenga*, obductus, ad crustam ligno durior.

*Rami* coronatim ac ordine decussato caudicem circumfident, suntque in pede, qui quatuor ferme cubitos oblongus, interius plani & nonnihil cavi, exterius rotundi ac in oris ob cuspides eminentes asperi & incidentes, infernè latiores ac spithamam fermè in latitudine æquantes, supemè strictiores ac latitudinem ferme unius palmi, in summitate folium prægrande, quod latissimum est, ac velut flabellum plicatum explicant; sunt autem folia hæc in plicarum oris eminentibus costis asperis obducta, in anteriore parte incisa, ac in plures cuspides stricta, contextura densa & crassa, in longum venis densis striata; rami cum tenerimi sunt cum suis foliis flabelli-formibus candida sunt & nitentia ac folia in se plicis convoluta, antè rursus haud incisa.

*Fructus* sunt externa forma similes fructibus *Tenga*, sed minores & rotundiores & in vertice nonnihil plani calyci arcuato & majori & foliis mutuo circumvolutis excepti, prodeuntes ex capsis quæ tribus foliis arcuato circumvolutis constant, ac supra ex exortu ramorum erumpunt, sunt autem hi fructus calyce arcuato & majori ex foliis mutuo ei circumvolutis composito excepti, corticis crassi exterius obducti corticula densa, quæ fructibus immaturis viridi-fusca, nitens ac glabra, ac iis maturis inferius supra calycem nigricans & nitens, ac sulcis seu fissuris in longum striata est, superius in vertice ex viridi-flavescentis seu prorsus flava, intrus autem cortex pulpam habet densam, quæ primùm mollis ac alba est, dein cum fructus probè maturi sunt, filamentis lignosis, tenuioribus ac mollibus & minus duris densè pertexta ac succulenta, saporis subdulcis & non ingrati, odoris fortis ac ejusdem ut caro fructus dicti *Schacca*; in medio pulpæ corticis duæ tresve nucleæ oblongo-rotundæ & planæ

D

pulpæ

pulpa intermedia à se mutuo sejunctæ confitæ sunt, constantque exterius operimento crasso ac lignoso, cùm vetustiores sunt, non-nihil petroso ac summè duro, quod in exteriori superficie filamentis lignosis albicantibus arctissimè obductum est, adeo ut minus glabrum sit quàm operimentum lignosum in fructu cocos; in hisce cùm teneriores sunt, intus medulla est coerulea & transparent, crassa, mollis & gelatina ac esculenta, saporis dulcis haud ingrati, quæ cum tempore valde indurescit, adeo ut mandi nequeat.

*Apud hosce Medicos non est in usu.*

F I G. 9.

Hujus *Talae Cocifera* complicito folio fructu minore, folium prægrande munere Domini Pauli Hermann, Medici & Botanici præstantissimi, Civitatisque *Columbæ* insulæ *Zenles* Consilium Julium dignissimi, possideo. Longitudine illud tredecim, & latitudine vel modico expansum novem pedes superat, caraque obtinet figuram, quam hic Auctores nostri describunt: Verum &

insuper, ubi foliorum lacinie vel divisuræ incipiunt, filamenta habet plurima, tereta, eisdem cum lacinia longitudinis, quæ deorsum propendunt. Addebat Dominus Hermann sexaginta milliaribus super *Columbæ* fuisse silicem, & ab incolis vocari *Talajaha*, id est, arborem umbrosam, foliis enim stantur umbraculi loco.



AMPA-



*Ampana de*  
 ॐ. २००  
 ॐ. २००  
 ॐ. २००



*na. lac.*  
 27 Mal.  
 'Ab.  
 183 bram

F. 10.





## A M P A N A.

FIG. 10.



*Ampana*, quæ secunda species, Ling. Bram. *Tala-* FIG. 10.  
*tâmado*, Lusitanis *Palmera Brava Machô*, cum *Ca-*  
*rim-Pana* eadem est, tantùm in eo differens, quòd

loco fructuum seu *Cocorum Capitula* teretia & flori-  
 fera proferat; hæc autem *Capitula* ex *Capsis* quæ  
 foliis mutuo circumvolutis constant, ac supra ex  
 exortu ramorum emicant, diversis caulibus, qui

duri, plani & primùm albicantes, dein virides sunt, prorumpunt,  
 in summitate unius caulis, duo triave sita; sunt autem capitula duas  
 spithamas plus minus longa, & nonnihil incurva, primùm cum cau-  
 libus albicantia, dein viridescencia & fractu facilia, in superficie plu-  
 rimis squammulis quæ ex intortione apertæ summitatem eorum re-  
 spiciunt, obducta.

*Flores* quos ferunt inter squammas ex suis oculis emicant in tra-  
 ctibus spiralibus, at non signatis, ac sibi mutuo parallelis confiti:  
 suntque stellulæ constantes tribus parvis interiùs cochleato-cavis ac  
 rigidiusculis foliolis, quæ primùm cum capitulo albicantes, dein  
 viridescentes sunt, constantes, continentur in medio quinque vel  
 sex tenuia stamina, quæ apicibus albicantibus, subflavis & gran-  
 diusculis ac striatis dotata sunt.

In hisce *Capitulis* floriferis intra carnem proximè ex adverso oculo-  
 rum florum *Gemma* oblongo-rotundæ ad superficiem erectæ,  
 quæ glabro loculamento oclusæ sunt, continentur, quorum oculo-  
 lis flores inferti sunt.

*Apud hosce Medicos non est in usu.*

FIG. 10.

*Palma* hæc ab aliis non descripta, non incommode meo  
 iudicio vocabitur *Palma Malabarica*, foliis stellatis, fru-  
 ctu longo equanato.  
 Mirus verò nature lusus in hac & præcedente specie  
 considerandus venit, quæ Plantæ quoad cætera simil-

linia, toto cælo discrepantes flores & fructus appo-  
 suit.

An autem eam ob rationem, ex Legibus nature, à Cla-  
 rissimo *Morqisæ* exhibitæ disungi debeat, unicuique ju-  
 dicandum relinquo.

E

SCHUN.







*Schunda-pana. lat.*  
 சூண்டா பனா *mal.*  
 چوندو پنا *Arab.*  
 સૂંદા પાનો *brah.*





## S C H U N D A . P A N A .

F I G. II.



*Chunda-Panà*, Ling. Bram. *Biralà-Madò*, est arbor Fig. 14  
procera nascens in arenosis.

*Radix* est rufo-obscuro cortice obducta, intrus in medio ligno molliori, fibris hinc inde vestita.

*Candex* ambitu amplexum duorum hominum implens in superficie obductus cortice seu potius crusta cinerea quæ deglubi nequit. Ad crustam est ligno duro interiùs medio ferme ambitus diametro ligno molli.

*Rami* qui ex caudice ordinatè prodeunt ac ordine decussato bini & bini ex se mutuo exsurgunt cum pede caudicem circumfident, quemadmodum rami *Ténga*, eumque reticulato raro cortice, cujus filamenta ex oris pedis originem sumunt, circumvestiunt, suntque in pede tenues & cavi, ac tomentosa rufa lanugine exterius obfiti, ac tactu velut coriacei, interiori superficie albicantes seu rufi, inferius latiores, parte superiori, quo à caudice reflectuntur, sunt rotundiores & duabus lacunis latis interiùs utrinque in longum striati, ex quibus versus oppositas partes furculos foliaceos qui angulati, virides, interiùs striati sunt, ac ad exortum extuberantes emittunt, exterius virides ac pilosa lanugine, quæ facile deteri potest, obfiti, intus filamentis lignosis laxè pertexti, suntque ob lignum paucum leves.

*Folia* in furculis ramorum ad interiorem partem exoriuntur caulem investientes, ac versus duas oppositas partes obversa, suntque oblonga ac velut triangulari ambitu circumscripta in una parte anteriora versus longiori ora, in altera quæ furculum proximè contingit, breviori excurrentia, ac cum duabus oris ad exortum angulum rectum acutum efficientia, atque adeo anteriùs latiora, ac in anteriori ora, quæ inter duas laterales intermedia est, ac cum ora interiori ac breviori angulum obtusum, cum exteriori ac longiori angulum acutum efficit, cuspidibus acutis eminentia, suntque contextura rigida, venis ex angulo exortus prodeuntibus, quæ certis intervallis velut nervi eminentes in adversa parte extuberant, striata in longum, superficie utraque glabra ac viridi-fusca, & valde nitentia; folia quæ in summirate ramorum oriuntur ex ramo tanquam costa intermedia protenduntur.

*Flores & Fructus* in capsis oblongis, quæ ex caudice supra originem furculorum foliaceorum transversum prodeunt, ac oblongæ sunt unum brachium, ac quatuor quinqueve viridibus scutellatis corticibus constant, simul proveniunt furculis numerosis, qui capsis apertis

F

ex

ex iis crumpunt, ac ramo medio crassiori coronatim circumpositi octo plus minus cubitos longi evadunt & graves fascias constituunt denso ordine arctè insidentes.

Sunt autem flores spicei, oblongo-rotundi, ac longitudine ferme unciali rectè furculis impositi ac nonnihil posteriora versus reflexi, & bini ac bini passim ex adverso ad se invicem siti, cùm se aperiant in duo, sed maximè ac ad summum in tria folia, quæ surrecta & cuspidata, rigida, dura, crassa, nullis venulis striata, ac interiùs nonnihil cochlearæ-cavæ sunt, se dividunt, uti & manuum pressione resolvuntur, colore primùm sunt viridi, post rubescente, seu purpureo-rubescente, dein flavescente, alii aperti, alii clausi atque adeo etiam diversi coloris, alii rubri, alii coeruleo-rubri dilutius, vel intensius, alii flavi.

E medio horum spiceorum foliorum emicat penicillus angustorum, flavorum, surrectorum ac striatorum foliorum, quæ instar staminum sunt.

*Gemma* fructuum juxta spiceos flores siti sunt, suntque minores quàm flores, rotundæ ac in vertice cuspidatæ, & cum cuspidate anteriora versus reflexæ, quæ floribus deciduis remanent ac in fructus excrefcunt.

Sunt autem fructus, cùm in justam magnitudinem excrevere, confertissimo suo numero fasciam ramorum valde onerantes, plano-rotundi furculis, qui striati sunt, sine petiolis insidentes, primùm cùm immaturi, duri ac virides, dein flavi, ac vetustiores rubicundi, cùm probè maturi, rubicundo-obscuri & nitentes, constantes cortice tenui & carne intus molli & rubra, quæ ex gustu linguam acerrimè pungit & lancinat.

Intus *Semina* seu *Nuclei* duo duri sunt, totam ferme capacitatem fructus replentes, forma oblongi, una parte rotunda, altera qua sibi mutuo accumbunt, plana, striis lacunosa, colore exterius rubro, ac carne intus albicante coerulea & rubra.

*Apud hosce Medicos non est in usu.*

# FIG. II.

Arborem hanc *Palma Dactylifera* esse speciem, non est quod quis dubitet: & nisi fructus carum linguam acerrimè pungere & lancinare traderent Auctores, non incommode ad *Palman Americanam* fructu racemoso C. *Babus* referri posse, opinare.

Quin & putem, figuram illam quæ *Eustoriam* Lib. 14. Cap. 111. *Chamaepitys Pregrina* nomine, exhibet *Clausus*, nihil aliud esse, quàm racemum aut fasciam, cui adhaeserunt hujus arboris fructus.





Bala la  
 ২৩৩  
 بنجیلا  
 कौ







la.  
 & mol.  
 Arab.  
 Bram.









Baja. lat.  
২৩৯ mal.  
Fluor Arab.  
কেলি gram.











Bala. lat.  
 ۲۱ و Mal.  
 بختاء Arab.  
 कठ brom.





## B A L A.

FIG. 12. 13. 14.



*Ala lingua Bramanum Kely*, est arbor ad duum hominum Fig. 12.  
altitudinem assurgens, nasciturque in arenosis.

*Radix* crassa est duas spithamas ac tres oblonga, ambitu rotundo, plurimis fibris capillatis, quæ intus lignosæ sunt, vestita, exterius fusca ac nigricans, intus carne albicante, quæ lapotis aquei, subdulcis & subaltringentis est, quæ incisa humorem albicantem nonnihil unctuosum, qui lapotis subdulcis & valde astringentis est, exudat, ac illicò subrubro, seu persico colore suffunditur; intervallo ferme pollicari ab ambitu annulo seu circulo tenui parum lignoso ac etiam molli in orbem pertexta conspicitur, ex quo fibræ radicis filamenta recipiunt, ac plurima filamenta lignosæ tenuissima versus corticem hinc inde deducuntur, rarissima autem ac brevissima versus interiores annuli partes.

Ex radice *Rami foliosi* simplices, quotum interiores ex exterioribus, à quibus arctè comprehenduntur, ordine ferme decussato emicant pede recto & oblongo, qui unius seu duum etiam hominum altitudinem metitur, assurgunt, cum superiori parte, in qua foliis vestiti sunt magis minusve à pede reflexi ac pandi, sunt autem in pede exterius rotundi, interiori cavi in ima parte pedis quâ superficiem radicis annulari tractu insident ac superiori æque lati ac latitudine unius spithamæ, in media pedis latitudine crassi ferme unum pollicem, ac inde versus oras sensim extenuati exterius cortice glabro & subviridi seu etiam viridi-flavescente, qui in filamenta candida, dura & valida in longum protrahi potest, interiori corticula seu membrana glabra & candida obducti; intus in longum perducti numerosis parietibus, albicantibus, simplicibus, parallelis, qui singuli venulis intus in longum striati sunt, ac plurimis transversis membranaceis intersepimentis in camerulas seu loculos, qui cortice exteriori & interiori oclusi sunt, distincti, sapore aquoso hæud adstringente; superiori parte, quæ à pede magis minusve reflexi sunt ac pandi, majores sunt crassitie, & minus lati, cum maxima latitudine infernè, inde sensim usque ad apicem strictiores, exterius rotundiores, ac interiori rotundiore cavitate, ac in oras extenuatas stricti, intus quoque ejusdem texturæ ut in pede, suntque rami intervallo à pede ferme spithamæ, seu etiam cubitali, nullo folio vestiti, inde usque ad apicem vestiti uno folio, constituuntque velut mediam costam foliorum, cujus latera ex ejus oris tenuibus utrinque excurrunt: cum teneriores, colore sunt in totum albicante; cum vetustiores, viridi-diluto ac cæruleo rote conspersi, dein cum majori ætate flavescentes.

*Folia*, quæ ramorum superiorem partem investiant, oblongo rotunda & lata sunt cum suo ramo medio seu costa longitudine ferme sesquihominis, in medio maxima latitudine, quæ ferme est unius cubiti, & inde versus apicem & imam partem strictiori, suntque superficie glabra, lenissima ac æquabilissima, subtilissimæ texturæ, adeo ut aqua in iis sparsim diffusa illico in rotundissimas guttulas se colligat, viridis in recta viridi & nitentis, in adversa minori nitore, saporis subadstringentis & subdulcis, venulis densis subtilissimis & parallelis, quæ ex oris costæ seu rami medii transversim excurrunt ac initio sui tractus ex inferiori costæ parte conspicue deducuntur, striata & in margine tubro limbulò cincta, in quem

venæ tractu superiora versus inflexo incurrunt, intervallis autem ordinatis ac ferme semidigitalibus venulis magis nitentibus sunt, ac in earum tractu in recta parum extuberantia, & in adversa rugulis tenuiter striata, ac in ipsis costæ oris in tractu suo oblique ex inferiore costæ parte conspicuè deducuntur, ac in margine ubi teneriota cum suo ramo in totum sunt albicantia, & in parte recta album sericum ex vividissimo candore & nitore æmulantia; folium intimum quod ex radice prodit ac ab aliis comprehenditur, in se convolutum est.

Post foliorum omnium, quæ ex radice originem sumunt, exortum, unus *Caulis* rotundus, qui parte inferiore nonnihil crassior, ex medio pedum ramorum foliaceorum è radice exsurgit in summitate cono nodulatus, ac ex eo hinc inde diffusis intervallis tami tres quatuorve, quorum superiores conum obtegunt ac involvunt, emergunt, quibus apertis & relaxatis conus se feras prodit arborisque partus conspicitur; horum autem ramorum folia trium quatuorve digitorum transversoium seu palmi vel spithamæ intervallo à superiori parte pedis eos investiant, suntque minus oblonga quàm quæ in prioribus ramis ac minori intervallo puta palmi vel spithamæ plus minus à pede exorta.

*Caulis* in parte ea, quæ à pede ramorum investita est, albicans & mollis ac tener est parte superiori, quæ cum cono foras se prodit, viridescit ac durior evadit, & filamentis nonnihil lignosis est pertextus, ac cum tempore rugis magisque pandus, estque intus in totum fistulosus ac saporis aquei, subdulcis & subadstringentis, ubi confringitur, plura filamenta candida ex superficie partium contractarum deducuntur ac longè protrahuntur; hic tener coctus ac à filamentis separatus est in edulis: succus in parte superiori contentus magis adstringens est & sublaetæus ac unctuosus.

*Fig. 19.* *Flores ac Fructus* simul in cono proveniunt; est autem conus spithamam longus, constans ex foliis plurimis oblongo-rotundis antierius contractioribus, grandiusculis, crassis, & sibi mutuo superimpositis, ac clausis, & in diversas series dispositis: quæ coriacea, exterius corrugata ac sulcis & interius venis in cuspidem desinentibus striata sunt; quæ exteriora folia, colore sunt exterius rubro-fusco & subcoeruleo rore conspersa, ac in interiori superficie sanguinea; quæ interiora, colore flavo & magis ac magis albicante, cum tener est, conus cum suo caule colore in totum est albicante; intra singula hujus conii folia quæ unum post alterum se aperiant ac dein decidunt, flores cum fructibus quibus insident seu flores soli includuntur, & quidem intra folia exteriora & inferiora flores cum fructibus simul, quibus insident, intra folia autem interiora & propius ad cuspidem conii sita, flores soli sine fructibus.

Sunt autem *Flores*, qui *Fructibus* insident, constantes quatuor foliis, tria sunt oblonga, surrecta & rigida, infernè latiora ac sensim in angustum contracta, crassa, nonnihil pellucida, albicantia, & nitentia, ac venis in longum striata, superius in cuspidem flava, atque eorum unum, quod exterius situm, latius est & superne in tres cuspides flavas incisum, duo cætera angustiora & in unam cuspidem contracta, atque ex hisce duobus unum quod folio latiori magis proximè adjacet cochlearæ cavitatis tenuæ & magis transparens, quartum folium quod inner duo folia oblonga, crassiora consitum est, & ex adverso folii oblongi tenuioris, est instar vesiculæ seu folliculi rotundi interiora versus convolutum, candidissimum, nitens, ac maxime transparens, tenuissimis venulis in longum striatum, minus oblongum, ac in ora rotunda verticis cuspidi crispata eminens, in se, cum nondum apertum est, humorem limpidum, unctuosum, ut ovi albumen, sed tenuiorem, ac subdulcem, instar mellis, continens.

E me

E medio *Florum* ex umbilico fructus quinque *Stamina* cum *Stylo oblongo* exsurgunt: *Stamina* erecta plana, & lata, ac parum crassiola, sunt ejusdem longitudinis, & candida.

*Stylus Rotundus*, crassius, oblongus, supra stamina ferme dimidia longitudine emicans, ac folia oblonga longitudine ferme æquans, inferius crassior, coloris albicans & rubescens, in vertice uno nodo crasso, plano, torundo, ac velut cereo & nonnihil ex albo fusco dotatus.

*Flores* qui nullum fructum dant prioribus ferme similes, sed nonnihil ab iis differentes, constantes tantum duobus albicantibus foliis, uno oblongo, surrecto & interiora versus contracto, ac supernè in quinque cuspides flavas, quarum duæ interiores angustiores sunt, inciso, quod in foliis prioribus est tricuspdatum, & altero folliculiformi tenui minori, quod à folio majori circumvoluto includitur, quod idem est ut folliculiforme folium in prioribus floribus, sed minùs amplum ac etiam liquorem subdulcem continens.

*Stamina*, quæ in hisce quoque quinque candida, sed oblonga sunt, ferme ad nodum styli exsurgentia, inferius nitentia & rotundiola, & supernè plana ac interius utrinque ad oras futura eminente fusca obsita; stylus oblongus, crassius, albicans, uno nodo crasso striato est dotatus: sunt autem hi flores pede rotundiolo, unciali, densi & carnosus, qui exterius & intus est albicans, ac tenerrimum fructus germen referens, constantes, ac suo pede ad ungues foliorum coniformis capituli, quod eos includit, semiannularibus extuberantiis caulibus seriebus ferme binis surrecti ac densè ad se invicem juncti, insidentes, ac oculos albicantes decidui relinquentes.

*Fructus* in suo *Caule* fasciatum seu plures congregatim proveniunt inferioribus Fig. 14. semiannularibus extuberantiis caulibus, quæ eo excrecente latius deducuntur, & quò magni inferiores sunt, eò latiore intervallo distant, positæ seriebus ferme binis plures ut duodecim, quatuordecimvè plus minus ad se invicem surrecti insidentes, ac in novem, decemvè distinctis ordinibus plus minùs caulem circumstantes, suntque oblongi longitudine plus minus unius spithamæ, cum maturi sunt minùs angulati seu rotundi, constantes cortice æquabili, crassio, exterius flavo, cum immaturi sunt, intus pulpa flava, densa, & molli, ac unctuosâ, quæ saporis dulcis & grati ac ad corticis interiorem superficiem carne minùs densa seu fungosa & albicante obducti, transversim secti in carne nota magis fusca seu rufa velut signo crucis interstincti, ac punctulis hinc inde nigricantibus conspersi, cum immaturi sunt, magis angulati, cortice viridi, qui, cum tenerrimi sunt, primùm est albicans, intus pulpa minus molli, & albicante, ac saporis adstringentis, ac expressi, liquorem exstillantes spissiotem, unctuosum, ac viscidum, qui in pannum decidens cum inficit macula, quæ nullo negotio elui potest.

*Fascia* horum *Fructuum* in uno caule ordinario tres pedes plus minus oblongæ sunt.

*Semina* in iis communiter nulla.

#### VIRESEJUS.

**R***Adix* contrita & epota in lacte vertiginem capitis sedat; ejus aqua cum saccharo permixta proficuè ebibitur pro ardore renum, quin & eadem aqua simpliciter epota pro doloribus ex urina abortis confert, daturque proficuè iis, quorum corpus argento vivo distillato infectum est, ut & iis qui inter edendum capillos hauserunt: corculum arboris putà caulem albicantem, qui fructum fert, tritum & cum melle intus sumptum malis oculorum convenit, ad

quod etiam servit butyrum in quo fructus seu fici in frustra secti sunt, eporum.

*Bála* ex diversitate fructuum plures ac diversæ sunt species, ut *Nendera-Bála* quæ fructum fert oblongiorem cæteris, qui in cortice est, colore rubro, & intus carne rubescente, suntque ejus species *Nera-Nendera*, quæ fructibus est grandioribus, & *Curo-Coddé*, quæ fructibus est minus oblongis, *Cadali-Bála* fructus fert gratis & jucundi odoris, qui cortice sunt tenui; ejus species *Schiru-Cadali*, quæ minores fructus fert, & *Erada-Caduli*, quæ sapore præferuntur: *Puim-Bála* fructus fert exactè rotundos, & oblongiores, ac crassiores quàm *Cadali-Bála*, qui saporis sunt optimi, estque ejus species *Turendle-Bála* utpote grandior. *Minnem-Bála* fert fructus angulatos quatuor superficierum, qui carne nonnihil oleosa ac pingui, sunt saporis magis dulcis, cortice crasso, habetque hæc folia crassiora cæteris & magis lata ac oblongiora; *Cinga-Bála* fert fructus oblongos ut *Nendera-Bála*, sed minùs crassos, & qui maturi viridi-clari sunt; *Canim-Bála* fructus fert multo minores cæteris, qui maturi, coloris sunt subflavi, ejus species est *Schündila-Canim-Bála*, quæ fructus fert valde parvos ac minores cæteris, ac nullos alios flores nisi qui in fructibus insident, atque adeo ramum totum usque ad verticem fructibus oneratum: *Calim-Bála* fert fructus cortice crassiole, in quibus semina nigra continentur. *Bangala-Bála* flores fert, qui sunt colore cæruleo-fusco.

*Bála* species communiter intra sex menses flores ferunt; *Puam-Bála* autem intra duodecim menses, fructus post quatuor menses maturefcunt; una arbor unum caulem ex radice edit ac fructu dato & ad maturitatem perducto emoritur, stolonibus qui ex ejus radice circumquaque expullulant in arbores excrescentibus.

# FIG. 12, 13, 14.

Nescio quid C. Bauhinus moverit, quod hunc arborem in *Pinnæ* vocaverit, *Palmam bonilem longi latissimæ Feliæ*, cum non duntaxat Auctores nostri, sed & alii testes oculati, proceram esse, & duorum hominum altitudinem æquare, testentur. Forfàn *Gesnerus*, qui *Pumilam* vocat, vel *Orindam*, qui pro loci ratione, *Pumilam proceram* esse asserit, huic opinioni assensum præbuit. *Majsa* vel *Maza* vulgo vocatur *Serapius*, *Mamægyptus*, *Alipis*, *Mul* & *Genec Mauritanis*, *Guilandinis* teste: *Pala* quoque vocatur *Flusis*, & *Quilibet Bengalepsus*, nominibus procul dubio, à *Malabarensium Bala*, & *Brammen Kaly* mutatis: *A Brasiliensibus*, ubi,

*Pisum* teste, abundè luxuriat, *Banana* & *Parabysu* vocatur. Parum autem sibi constat C. Bauhinum, dum à se invicem dijungit *Majsam*, & *Ficem Indicam Ratanum* sive *Banana*, cum reversa una & eadem sit arbor, licet ratione fructus, aliquot ejus dentur differentie, ut pluribus etiam nostri Auctores inculcant.

Arbuculum quoque tenellam, satis tamen vegetam, hoc anno ex *Zeilan* ad nos attulerunt, reducis inde naues, quæ an hyemem feret, dies docebit.

Nam porro sit *Dudoum* in *Babilis*, *Una* quam ex terra benedicti *Majsi* attulerunt, *Fum Pharonu*, vel *Pomum Paradyi*, judicent alii.



1. *Amba-paja*. lat.

2. *Papaja*. lat.

అంబాపాపా mal.

పాపా mal.

امبا پاپا Arab

پاپا Arab

दादु पापाय bram.

पापाय bram.









## A M B A P A J A.

FIG. 15.



*Apája* duæ sunt species, una *Amba-Pája*, altera *Pajamaram*. FIG. 15.

*Amba-pája* ling. Bram. *Dadul-Papája*, est arbor ad altitudinem quatuor hominum asurgens, fruticosa, nascens in arenosis.

*Radix* rectà se demittens, estque albicans, constans cortice ac carne albicante, humida & pingui sine ligno, estque odoris fortis, oleosi & grave-olentis, saporis quoque pinguis & ingrari.

*Stirps* simplex est pedem crassà, estque ad radicem intus solida, albicante, humida & pingui carne repleta, superiori parte cava ac distinctis inintersepimentis carneis pingui-humidis, & albicantibus clausa, constantque cortice denso, viridi & pingui-humido, qui filamentis minus lignosis est perrexurus, ac intus, ubi cava est stirps, membrana tenui & albicante vestitus.

*Folia* cauliculis cavis, viridi-dilutis & albicantibus, ac intus quoque pingui-humidis, qui duos ferme pedes longi sunt, ac ad stirpis interiora intersepimenta crumpunt, & ad originem paulò crassiores sunt, infident, suntque laciniata, incisa in septem lacinias seu folia, quæ singula antèriùs cuspidata sunt, ac cuspidibus lateralibus eminent contextura tenuia, mollia & lenia, viroris in adversa fusci, in recta communis.

Ex periolo septem *Costæ* majores & viridi-dilutæ ad extremos cuspides cujusque folii excurrunt, quæ hinc inde costulas transversas diffundunt.

*Cauliculi* novi è summirate caudicis semper crumpunt, verustioribus, qui in inferiori parte stirpis sunt, deciduis, ac noras albicantes in ejus cortice viridi relinquentibus.

*Flores* in periolis tenuionibus, rotundis, tres spithamas longis, viridi-dilutis, qui intrus corculo sunt albo, ac in medio rubulo per-rufi, pingui-humidi, ac supra ex origine caulium quibus folia infident oriuntur, plures congregatim ac umbellatim proveniunt, suntque albicanres, odoris grati & jucundi, quinque oblongo-rotundorum foliorum in stellæ formam expansorum cum pedunculo viridi-diluto, albicanre, calyci parvo, arcto & viridi-fusco insidentes: folia crassifolia sunt & densæ texturæ sine venis, in exteriori superficie in uno latere coloris viridi-diluti albicantis ut pedunculus, ac reli-

H

quo

quo latere in quo etiam exterius coloris albicantis sunt, crassiora. Ex medio emicat corculum flavum constans decem oblongis apicibus qui brevissimis stamunculis ad unguiculos foliorum superiori pcdis parti in duabus seriebus interius affixi & inserti sunt.

*Gemma* *Florum* oblongo-rotundæ, primùm virides, dein subflavo-albicantes.

*Fructus* fert nullos.

*Flores* fert toto anno.

Tota hæc planta seu frutex aut arbor est pingui-humida, ejusque humor qui ex radice vel stirpe vel caulibus foliorum ac florum incisis exsudat, est primùm aquei subcœrulei & subalbicantis coloris ac transparentis, qui ex actu aëris confestim in unctuosam, magis albicantem & subcœruleam materiam inspissatur.

Aqua quæ ex fl. distillatur, odoris est pinguis ac moleolentis.

*Apud hosce Medicos non est in usu.*



## PAPAJAMARAM.

FIG. 15.



*Apajamaram*, quæ secunda species est, *Papaja* Fig. 15.  
ling. Bram. *Papaja*, arbor minùs excelsa, caudice  
minùs crasso, cum petioli in floribus differens, ut  
& quod fructus habet.

*Flores* ex quorum medio seu orificio fructus  
erumpunt cum suis fructibus parvis petiolis in stipe  
hinc inde proveniunt, albi sunt & odoris jucundissimi, constan-  
tes quinque foliis oblongis, quæ anteriota versus rectis oris in cu-  
spidem se contrahunt, ac rigida, crassa, & densa sunt sine venis con-  
spicuis, exteriora versus cum cuspidē reflexa ac intorta.

*Calyx*, quo continentur, quinque brevium cuspidum est, qui fo-  
liis florum decisis fructum inferiùs complectitur.

*Fructus* qui singuli ex medio uniuscujusque floris erumpunt, nul-  
lo vel tenuissimo sunt cortice, carne densa & solida ac pingui-humi-  
da; cùm immaturi, carne sunt albicante & saporis pinguis ac astrin-  
gentis, exstillantes humorem aqueum subalbicantem & subcœru-  
leum, qui inspissatur, ex maturitate carne interiùs flavescente, ac sa-  
poris haud ingrati pingui-dulcis, intus grandi cavitare ac in interiori  
superficie, quæ in longum quinque rotundis lateribus excurrit, fun-  
gosa carne obducti.

Semina in interiori superficie inter fungosam carnem numerosa in  
quinque seriebus confita sunt, quæ in medio rotundorum laterum à  
se mutuo interstinctæ sunt, suntque ossicula rotunda, angulata,  
aspeta & nigra, singula involuta in propria membrana albicante, ac  
transpatente, & nitente, ac parvis & tenuibus umbilicis adhaerentia  
nucleo intus albo.

*Fructus*, cùm teneri sunt, & in medio florum confiti, superiora  
versus in cuspidem contracti seu conici sunt, ac in cuspidē quinque  
angustis, crassis, subflavis foliis, quæ in anteriota parte latiora, & in  
I cuspi-

cuspides divisa sunt coronati, ac incisi gemmulis rotundis albicantibus in interiori superficie obsiti sunt.

*Fructus* fert toto anno.

*Apud hosce Medicos non est in usu.*

. F I G. 15.

Hæ arbores quoque duobus in locis, scilicet diversisque nominibus à C. Bauhino proponuntur in *Pinace*.

Primum Libro x. Sect. v. *Capite de Platano*, hisce verbis: *Arbor Platani folio fructu Persici magnitudine eduli, Manacra ipsa arbor: at fructus Manacra, ab alterius ferre similitudine: Lusitani in America est mas sterilis, summa fructifera*, Claf. cat. pag.

Deinde Libro xii. Sect. 1. *Capite de Fica*, frequentibus verbis: *Ficusam speciem fructum Persicam, Papaye fructum genus suum specie.*

In utraque India satè frequens conspicitur: à Bonis arbor vocatur *Melansifera* s. *Papaye*, à Pison *Pinguape*, qui marem æque ac foeminam fructum ferre refert

(serus ac Clafus, nobisque auctores statuunt) licet minorem & oblongiorem, fillumque esse foeminam non ferre fructum, nisi mas adflet: quod & confirmat *Recherches*.

Falsum Colonna fuit in *Recherches Commentarii*, hujus quoque arboris nomine *Papaye Orientalis* & *Papaye arborescentis* mentionem facit, testaturque se ejus semen unà cum accuratissimâ Plantæ descriptione accepisse, à famigeratissimo *Petro de Valle*, è duodecimo peregrinationis suæ anno reducere: Nobis etiam ex Occidentali India quandoque fuit transmissum, & feliciter germinavit, verum hyemalis culturae impatiens, & frigoris exola, nunquam percrenavit.







Gly. lat.  
உலு mal.  
بلحج Arab.  
वारी brah.









## I L T.

FIG. 16.

**L**z lingua Bramanum *Vāsi*, nostra communi *Bambū*, est Arbor nascens in arenosis, in excelsam altitudinem, quæ eam *Tēnga* exsuperat, evadens.

*Radix* ab ipso stipite non multum differens, nisi quod albicans & plurimis radiculis seu fibris sit vestita; ex geniculis, quibus distinctus est, novos oculos seu cauliculos geniculatos emittit, atque hi etiam alios ex quibus tanquam novis radicibus caules plures simul juncti assurgunt, atque ita caules novelli cum suis radiculis avulsi profeminantur; Caules autem rotundi, cortice viridi, duri & geniculati sunt ex geniculis novos ramos furculosque emittentes, atque in ipsis geniculis spinis oblongis, rigidis, acutis, uno vel etiam duobus pluribusve muniti, intus fistulosi fistulis subtilibus.

*Stipites*, qui ex radice ipsa exsurgunt, ad duorum triumve hominum altitudinem se erigunt, priusquam laterales ramulos seu furculos diffundunt, ac crassitie ferme unius spithamæ evadunt, cum teneri ac novelli sunt stipites, uti & rami ferme solidi, in medio uno tantum parvo tubulo pervii, cum maximè novelli sunt, in medio, ubi tubulus aperitur, nota albicante sunt; cum vetustiores, intus cavi, & ad geniculos intersepimento lignoso clausi, & interiùs membrana tenui, albicante obducti, constantque lignosis, duris, albicantibus filamentis, cum teneriores sunt, exteriùs viridi-fusci; cum vetustiores, ex albo flavi & nitentis coloris, nullo cortice, qui lignosis filamentis interstinctus est, vestiti: Stipites hujus arboris cum vetustiores sunt, aliquo genere calcis in cavitate obducuntur, quæ usui medico servatur.

*Folia*, quæ geniculis caulium brevissimis petiolis insident, longa & angusta sunt longitudine unius spithamæ, latitudine quæ ad petiolum maxima est, digitali, versus summitem sensim stricta, venis in longum striata, & in exteriori parte in medio uno nervo obfita, oris aspera si versus inferiora stringantur, vironis utrinque communis.

*Flores* in spicis squamosis, qui nodulis caulium congregatim insident, proveniunt, atque ex spicis apertis tenuissimis filamentis dependent, intra quas se deinde recipiunt velut flores spicati oryzæ, suntque deinde in spicis tritico similes, nisi quod minores sunt; sexagesimo anno à satione, ut ferunt, hæc arbor flores fert per unum

K

ferme

ferme mensem proximè ante florum exortum, primùm omnibus foliis spoliatur, & postquam defloruit, emoritur.

## V I R E S E J U S.

**C**orticis & Foliorum decoctum epotum servit ad sanguinem in corpore ex vulnere retentum expurgandum, confertque etiam puerperis ad materiæ sanguinolentæ, quæ post partum retenta est, excretionem. Calx quæ in stipitibus vetustis crescit, prodest in stranguriâ, iisque qui urinam purulentam mingunt.

FIG. 16.

*Arundinem* hanc Auctores nostri inter arbores describunt, eodem quo *C. Bambus* jure, cui in *Pinete* dicitur, *arundo arbor*: in qua humor lacteus gignitur, qui *Tahaiti Arabes* & *Americæ Manis Indiam*, in cujus arundinibus *Tahaiti* sive saccharum, *Manis* *Gatæ*. Rectius Dominus *Hernani*, qui Anno 1676. portionem Plantæ siccata, unâ cum foliis & floribus ex insula *Zeilæ* transtulit, *Bambus* denominationem nonnulli immutavit, dum vocat *Arundinem Indicam arborem maximam, cæcis spinis*. Addit porro quod *Cingalesibus* vocatur *Nagha*, id est, arbor febrilis, qua febre corripuntur si qui se lavant ex aquis, in quas arboris hujus folia deciderint. Corruptè vulgò à *Latinum* aliquo vocatur *Bambus* vel *Bambus*: in insula autem *Madagascariæ* præsertimque ejus Provincia *Galembous*, teste Domino *Haisart*, tanta nascitur copia, ut regio inde nomen obtinuerit. *Palis* enim ibidem nuncupatur. Ad quam immensam autem locis humidis, arenosis & paludosis, quibus gaudet, quandoque affertur proceritatem, ex fragmentis, Clarissimi *Pissini* munere, in portico Horti Academici suspensis, colligere datur: quorum majus viginti octo, minus viginti sex pedum longitudinem superat. Quin & creditale est, hæc *arundines*, antequam essent distractæ, du-

plo majorem longitudinem obtinuisse, cum crassities unius extremitatis, ab alterius vix differat. Admiratione quoque dignum est, tam vastam arundinum molem, tam exiguis vestigiis foliis, cum maxima exsiccatis, quæ asservo, vix spithamam longitudine aut transversum digitum latitudine transcendat. *Arundines* hæc insuper amputatæ, & igne cæmata, fertilissimum præbent cinerem, in quo omnis generis consetæ plantæ feliciter proveniunt: dum autem cremantur, ingentem edunt sonitum, & frigore centum aliquot scopulorum explosiones emulcent. Aer enim intra cancellos, intermediorum ope reclusus, dum rarefit, ampliusque spatium desiderat, parietes quasqueversum dirumpit, & vi sibi exitum querit.

Quam varia autem, non minus ac *Palma Cæcifera*, hæc planta humanum in commodum suppeditet auxilium, pluribus tradunt Auctores, & imprimis *G. Zys* in *Manis Arundinis*, ubi præter accuratissimam *Sacæ Manis*, sive *Tahaiti* descriptionem, videre quoque licet, testellos hujus *Arundinis* ramos, præsertim radici vicinos, ab lada conditi, & celeberrimi confectiois quæ *Acher* vulgò nuncupatur, & ad appetitum excitandum, ventriculique concoctionem promovendam per Europam dispergitur, non in finem partem consilivere.



MALA-








*Jambu-de Malacca. Lar.*

മലക്കുമാല Mal.

ملائكة جَامَنَحُ Arab.

मलाक्या Brm.







## MALACCA SCHAMBU.

FIG. 17.



*Chambu* duæ species, una *Malacca-Schambu*, altera *Nati-Schambu*. Fig. 171

*Malacca-Schambu* ling. Bram. ejusdem nominis, est arbor procera ramis densis & opacis transversum sparsis.

*Radix* crassa est, ramos quaquaversum diffundens, cortice est cinereo, intus rufo, ligno albicante.

*Stipes* ambitu amplexum unius brachii paululum excedens, cortice cinereo, tami cinereo magis fusco, furculi teneriores vitides.

*Folia*, quæ in tamis bina & bina ac ordine se mutuo decussantia petiolis viridibus, curtis, crassis, intetiùs planis seu latè striatis proveniunt, oblongo-angusta, rotunda, anteriùs cuspidata, ad petiolum quoque stricta, longitudine maxima unius spithamæ, latitudine duorum triumve pollicum, quæ minùs longa evadunt, cæteris latiora, suntque textura crassiola & solida ac densa, superficie glabra, virore in rectâ valde fusco & nitente, in adversâ virore communi, saporis adstringentis ac nonnihil subacidi seu vinosi diutius masticata, odoris nullius, cum emarcescunt, sunt flavescentia ac crocea.

Ex costa media, quæ in adversâ folium eminet, *Nervi* subtiles & parum in adversâ eminentes, recta obliquo ac fette parallelo ductu anteriota versus exeunt, ac æquali intervallo à margine reflexi in se invicem atuatim incurrunt velut limbulum ad marginem relinquentes, suntque in rectâ parte tractibus suis conspicui ac venulis minutulis, subtilibus, intra folium meantibus comitati.

*Flores* in petiolis seu furculis viridibus spithamam plus minus longis, qui supra ex origine foliorum oriuntur plures congregatim, tres, quatuor, quinqueve parvis ac semidigitalibus, totundis, crassiolis & viridibus pedunculis proveniunt, constantes quatuor foliis ex vitidi albicantibus, oblongo-totundis, interiùs cochleatis, rigidis à se mutuo latiusculè distantibus, quæ exteriùs magis viridia sunt, & in oris superioribus interiùs & exteriùs magis albicant, & venulis annulatis versus oppositas oras in longum striata sunt, suntque ad ungiculos foliorum ornati denso penicillo confectorum, longiusculorum, candidorum staminum, quæ ex ora quadrata orificii medii cancelliformis lati & cavi se exserunt, & in vertice apicibus seu nodulis ex albicanti flavescentibus dotata sunt, & in medio penicilli staminum stylo albicante crassio, sutrecto & in apicem definente, qui ex medio orificii seu umbilici exsurgit.

L

Calyx

*Calyx* est quatuor brevium lato-rotundorum ac interiora versus quoque cochleatorum & magis viridium foliorum, quæ singula inter duo florum folia exterius confident, ejusque pes crassius versus inferiora se in conum stringens, & nonnihil ex viridi albicans, ac à reliquo petiolo florum, qui viridi-fuscus est, nodulo distinctus, estque ipsum primordium fructus, ac magis & magis extuberans & turgescens. Sunt autem flores odore nullo cum in suo vigore sunt, ac vivido colore, ubi autem flavescent ac emarcescent, quo tempore ex albicante flavescent, acido seu vinoso sunt odore.

*Fructus* sunt minores illis secundæ speciei, forma rotundi, primum virides, cum ad maturitatem accedunt, ex albicante subflavi, probè autem maturiores magis flavescentes, in vertice, umbilico seu orificio quadrato florum clausi, & quatuor foliis calycis viridibus ad se mutuo contractis & nonnihil surrectis coronati, constantque exterius corticula seu membrana tenuissimâ, carne humida, intus magis albicante, lara cavitate in medio, ac ad interiorem carnis superficiem filamentis nonnullis fungosis & albicantibus obducti, suntque saporis dulcis & grati, ac odoris rosacei valdè amœni, quem etiam in sapore expirant atque exhibent; in medio cavitatis nucleus est rotundus, cavitate minor, latus, & liber, ac durans, qui cortice exterius est rufo ac spadiceo-diluto, interiùs densa ac viridi-diluta pulpa, quæ saporis est subamari & adstringentis, ac vel simplex est, vel in duos tresve minores nucleos angulatos resolvitur.

## V I R E S E J U S.

*Ejus Decoctum* in aqua servit pro fissuris oris si cum eo ablatur.

## F I G. 17.

Qui à C. Bauhino dicitur *Persea officinalis fructus Malacris*, idem est cum fructu arboris hinc descriptæ; quæ à Casarino tambo, à Lusitano lambere, ab Arabibus *Tapha Indu*, à Persis *Taphet*, à Turcis *Alma*, Christophoro à Casta teste nuncupatur. Ex *Malacca* piperifera, ut refert Clarissimus Rijk, in distitas quasque regiones, ob florum fragrantiam, & fructus suavitatem, translata fuit hæc arbor, imprimisque ob perpetuum florum & fructuum vicissitudinem: quod altera arboris medietate, frondibus & fructibus orbâ, altera pars fructibus

maturis & immaturis tandem oneretur ac ornetur, donec frondes recuperaverit.

Flores & fructus ex ejusdem relato, frigidi sunt & humidæ qualitatæ, insigniter fragrantæ, ac proinde inter primas delicias omnibus pariter incolis habiti.

Plurimi quoque usus passim in Medicinâ existunt: fructus enim crudi, & flores saccharo conditi, ab ægris estuantibus cum successu usurpantur, quod succola frigiditate, sicut in febribus extinguant, spiritusque vitales confortent.









## NATI-SCHAMBU.

FIG. 18.



*Ati-Schambu*, quæ altera species *Iambu* est, ling. Fig. 18.  
Bram. *Schambu*, arbor quoque excelsa.

*Radix* crassa, ramos quaquaversum diffundens, cortice albicante, ac cinerea corticula, quæ facile in squamas deteritur, obducto, qui saporis est adstringentis, ligno intus albicante.

*Caudex* ambitu unius hominis amplexum implens, cortice exterius scabro ruffo-viridescente ac molli, intus albicante, qui adstringentis, acidi vinosique saporis est.

*Folia*, quæ in petiolis crassioribus curtis bina & bina proveniunt, grandiora sunt illis primæ speciei, forma ad latitudinem minus oblonga, contextura quoque densa, solida ac crassifolia, superficie quoque plana & glabra, viroris in recta fusci & nitentis, in adversa clari, saporis adstringentis & magis acidi seu vinosi, odoris quoque parum acidi, cum marcescunt, flavo quoque colore tinguntur.

*Flores* forma iidem & penicillo staminum breviori, suntque folia cum stylo, ut & penicillo staminum, quæ apicibus suis flavis seu subrufis dotata sunt, pupureo-rubro nitentis pulcherrimi ac viridi coloris, primùm odoris nullius, dein cum marcescunt, parum acidi.

*Calyx* quoque quatuor viridium interius cochleato-cavorum foliorum.

*Fructus*, qui quoque ex calyce exoriuntur, majores sunt illis primæ speciei, forma oblongo-rotundi & ad petiolum strictiores, in vertice quoque umbilico florum clausi & foliis calycis viridibus ad se invicem contractis coronati, suntque primùm virides, dein ex viridi albicantes, post virore evanido albicantes, cum maturi, ad unam partem candidi, ad aliam rubescences, ac inter candidum colorem striis

M

rubris

rubris perfusi, cortice quoque tenuissimo & carne alba ac succulenta, in medio etiam lata cavitate, & in superficie interiori carnis fungosis, albis & exsuccis filamentis obducti, saporis sunt vinosi & pergrati, ut & odoris; intus nucleus est grandis cavitatem fructus implens, qui quoque cortice exteriori rufo & spadiceo, interius densa ac viridi-diluta pulpa, quæ saporis quoque est subamari & adstringentis, constat.

Bis in anno fert fructus.

#### V I R E S E J U S.

Cortex ejus tritus & in lacte acido epotus dysenteriam sistit.

#### F I G. 18.

Hæc præcedentis arboris altera est species: præter enim Autores postros, plures dari, testantur Pifo, Alesia, & Paludanus. Peculiaris autem, & à nullo, quod sciam, descriptæ, ramum siccatum fructibus immaturis onustam, una cum feminibus, ex insula Zeilan, hoc anno transmissit, jam sæpius laudatus Dominus Hermann.

Vocata hæc fuit ab ipso *Lambes Sylvestris*, fructu cerasi magnitudine, *Walgandæ Cingalesium*: obtinetque folium, *Lambes* majoris folio non multum dissimile, fructus autem cerasi magnitudinis, uvæ in modum, racemim coherentes, quorum vertex cingitur tribus foliis bifidis, coronam quasi confluentibus.



CHAM-







*Schampakum. Ser.*  
 செம்பகம். mal  
 چيائنجائنام Arab  
 चापा brah





## CHAMPACAM.

FIG. 19.



*Hampacàm* lingua Bram. *Champò*, est arbor procera Fig. 19.  
dentis frondibus latè sparsis, nascens in arenosis.

*Radix* ruffo cortice qui saporis est amari & peracris.

*Caudex* unius hominis amplexum ambiru implens, cortice crasso, exterius cinereo, intrus molli, sub exteriori corticula viridescente & ex albo flavescente, qui saporis est amari, & subacris, ligno albicanre.

*Surculi* rotundi, cinericei, ac sub exteriori curiculâ virides, in apice ubi novello germine expullulant, spadicei coloris: suntque caudex, rami ac surculi cortice quoque adstringente.

*Folia* quæ hinc inde in surculis petiolis uncialibus, interiùs striatis, in inferiori parte nonnihil exuberantibus proveniunt & passim novello germine surculorum qui supra eorum exortum prorumpunt, comitara, oblongo-ronunda, aneriùs in cuspidem oblongam angustam contracta, spirhamam & amplius longa, latitudine quatuor quinque pollicum conextura duriola, superficie plana & lenia, vioris in recta fusci & nirentis, in adversa clari: saporis amari & acris.

Ex costa media, quæ crassa est, & in adversa altè eminens, ac tenuiter in recta *Costa* obliquo & parallelo ductu aneriora versus exeunt, ac à margine reflexæ arcuatim in se invicem incurrunt, venulas nonnullas transversas ex se distribuentes, ac in adversa solùm parte eminentes, & in recta vestigia tractuum exprimentes; ad exortum foliorum cortex surculorum tenui fissura, quæ obliquo ambiru est, hiar, ac per eam cortex inferior qui magis exuberans est, à superiori cortice inerstinguitur, suntque folia cum suis petiolis ex superiori parte fissuræ prodeuntia.

*Flores*, qui in summirare surculorum supra ex origine foliorum crassis, subflavo-iridibus, lenibus, surrectis ac sesquiuncialibus petiolis proveniunt, sunt acuri ac fragrantis odoris, constantque foliis oblongo-angustis, quæ in triplici ordine posita sunt, quorum quæ in exteriori ordine sunt, octo plus minus latitudine ferme tripla iis, quæ in secundo interiori ordine etiam octo plus minus sunt, ac versus summitatem rorundiola & nonnihil cuspidata, quæ in secundo ordine magis cuspidata, quæ in tertio ordine parvula, brevia, versus summirarem maxime cuspidata, flavo-dilura, ac velut stamina crassiola, inferius circumambienria stylum crassum, qui in medio pedun-

N

dun-

dunculo rotundo exurgit, ac superiora versus nonnihil conicus est, & spicis, parvis, viridibus, crassiolis, cuspidatis scutellarim circumdatus; suntque spicæ in cuspidē, quo inferiora versus inflexæ, rubescentes ac rudimentum fructûs continentes: floribus quoque sapor adstringens & acris est.

*Fructus*, qui spicatim seu racematim crasso petiolo medio viridi, ac tortuoso pedunculis crassis, & curtis circumfident, sunt oblongo-rotundi, magis minusve gibbosi, cortice crassio, primùm viridi; cùm maturi, flavo-diluto albicante sapore peracri, odore minus grato.

*Semina*, quæ intus continentur se invicem proxime sine ullo intersepimento contingunt, suntque uno latere rotundo ad fructûs formam accommodata, reliquis planis tribus quatuorve pro ratione mutui contactus: constantque, cùm matura, pulpâ tenui, humidâ, sub-lacteâ, quæ membranâ incarnato-rubra est investita, intus ossē grandisculo nigro.

*Flores* bis fert in anno, fructus non dat nisi cùm vetustior est.

Ex fl. aqua odorif. quæ eorum odorem spirat, distillatur.

#### V I R E S E J U S.

**R**adix & cortex siccus tritus & mixtus cum lacte spisso dicto *Tayr* apostematibus aperiendis & maturandis serviunt in forma emplastri appositi; *Cortex Radicis* in pulvere cum aqua calida datus menstruis in mulieribus excitandis servit, foetumque in gravidis expellit, si largiùs ac copiosius fumatur: *Flores* triti & cum oleo decocti, pro doloribus capitis, oculorum affectionibus, ut & in podagra serviunt facta capitis unctione. *Aqua ex Floribus distillata*, præcordiis exhilarandis commoda est; *Oleum*, in quo *Flores* per quadraginta dies insolati sunt, in capitis perunctione ejus doloribus ac animi deliquio prodest; *Oleum Fructuum* flatus pellit, si cum eo corpus ungatur.

#### F I G. 19.

Nominis affinitas, florum gratissimus odor, alique quæ huic Plantæ ab Autoribus adscribuntur circumstantiæ, non difficulter mihi persuadent, eandem esse cum ea, quæ à *Boiss* Cap. 45. describitur. licet færet ejusdem descriptionem obscuram esse: mutabilem, quin & fortis variabilem: quod primâ fronte

liquebit, si quis eandem cum figura diligentiùs conferat. An autem eadem sit cum *Champ C. Baubai*, de qua in *Pinus* inquit: *Change diameter alii flores, quorum etiam magnus apud Indos usus est, idem gratiori, quam lilium. Gera. Frago.* pronuntiare vix ausus sum.







*Elengi* Lat.  
 රි ව හි mal.  
 عسلج Arab.  
 வகி tam.





## E L E N G I.

FIG. 20.



*ElenGI* lingua Bramanum *Varualli*, est arbor proce-  
ra frondibus densis & opacis latè sparsis, nascitur-  
que in arenosis. Fig. 20.

*Radix* crassa & altè se in terram figens, ramos-  
que subtrus & super terram transversum latè dimit-  
tens, cortice lacteo, ac sub crusta exteriori fusco-  
rubescente.

*Caudex* duùm hominum amplexum ambitu ut plurimum implens :  
cortice crasso exterius fusco & scabro, interiùs lacteo ubere ipisso,  
& glutinoso, fissili, ac ubi finditur, colore flavo & rubescente vivi-  
dè variegato, interiori superficie ex albo-rubescente ; ligno est quo-  
que lacteo, fissili, gravi, in aquis summè durabili, extra aquas pu-  
tredini facillè obnoxio.

*Folia*, quæ hinc inde in parvis viridibus, rotundis ac interiùs stria-  
tis petiolis proveniunt, sunt oblongo-rotunda, ad petiolum rotun-  
dis oris, anteriùs brevi cuspide, qui versus exteriora reflectitur, cras-  
siola ac solidæ texturæ, superficie plana, ac in recta parte virore  
fusco & nitente glabritie, in adversa claro & minùs nitente, lateri-  
bus interiora versus nonnihil clausis, odore uti folia pyrorum no-  
strarum.

Ex *Cossa* in recta etiam parte eminente *Vena* transversæ, subti-  
les, ac densæ excurrunt, quæ folium subeunt, suntque utrinque  
conspiciuæ.

*Flores* proveniunt passim ex origine foliorum etiam quinque, sexve  
congregatim petiolis pollicaribus ex viridi-flavescentibus, suntque  
albicantes, & dein ex albicante flavescentes seu ex flavo fuscescen-  
tes, forma stellæ sedecim foliorum oblongo-angustorum & cuspi-  
datorum, quorum duo & duo arctiùs juncta sunt, odore jucundo  
& fragranti. In medio corculum crassum & conicum est, quod octo  
albis surrectis foliis est circumdarum, constans octo staminibus sur-  
rectis, curtis, crassis, albicantibus & pilosis, quæ versus summitatem  
in cuspidem stricta & flava sunt, ac circumposita capitulo albicanti-  
subflavo, quod germen fructus est, ex quo stylus viridi-dilutus &  
albicans emicat.

*Calyx* est octo oblongo-angustorum, cuspidatorum, stelli-formi-  
ter expansorum foliorum, quorum quatuor exterius flavescentia ac  
muscosa sunt, quatuor quæ inter ea se intergerunt, exterius albi-  
cantia:

O

cantia: singula folia calycis folia duo florum, quæ arctius juncta sunt, subcingunt.

*Gemma Florum* conicæ sunt & muscoli coloris.

*Ex Floribus Serta* seu *Coralla* efformant.

*Fructus*, qui suo calyce inferius comprehensi, sunt oblongo-rotundi ac instar olivarum, primum virides, dein flavi ac rubescentes, carne sub cortice flava & farinacea: suntque in eduliis.

Intus passim unum ac etiam duo grandiuscula *Officula*, quæ oblongo-rotunda, nonnihil plana, & spadiceo-fusci ac nitentis coloris sunt, continentur.

Bis in anno hæc arbor dat *Flores*. *Ex Floribus aquam stillatitiam* indigenæ eliciunt, quæ odorifera est.

#### V I R E S E J U S.

**R***adix* trita cum aceto tumorem in facie tollit, parte affectâ cum eo linita, eadem cum *Aqua* eod. modo sumpta servit pro oris pustulis. *Corticis Decoctum* servit pro angina, uti & dolore dentium; gutture seu ore cum eo abluto. *Aqua distillata ex Floribus* & epota proficua est pro melancholicis & febricitantibus; gravidis in difficili partu *Fructus* triti in aqua calida commodè dantur.

#### F I G. 20.

Cum hujus plantæ ne vestigium quidem apud alios invenerim, vocandum censco, *Olea-asterum* *Syrjalis Malabaricam*, sive *stansfero* *sericata*. Neutiquam au-

tem confundi debet cum *Vasculi Brachium*, sive *Parasitica* *Aroli*, de qua arbore vide ejusdem *Aromat. Historiam*. Cap. 14.




MAN.





Manjapumaram. Lat.  
 മഞ്ചപുനരം. mal.  
 ما جاحق مفر من. Arab.  
 ചാടിനകു bram.







## MANJAPUMERAM.

FIG. 21.



*Anjapumeram* ling. Bram. *Pariatacu* est arbor grandis trium quatuorve hominum altitudine, densis & opacis frondibus latè sparsis, nascens in arcuosis. Fig. 21.

*Radix* ramos subtus & super terram transversos spargens.

*Stipes* ambitu amplexum unius brachii æquat, cortice cinereo.

*Surculi* quadrangulares ac nodulati, spadiceo cortice, qui interiùs est viridis, obducti.

*Folia* in nodulis brevibus, crassiolis, viridi-albicantibus petiolis bina ac se mutuo in ordine decussantia proveniunt, suntque ad petiolum lata curvitate, & anteriora versus in cuspidem angustum contracta, contextura crassa, superficie aspera, virore in recta fusco & nitente, in adversa autem claro, sapore adstringente & sub-amaro.

Ex *Costa* media in adversa parte *Costa* hinc inde excurrunt, quæ rectam tractibus striant in se invicem arcuatis ductibus propè ad marginem incurrentes.

*Flores* proveniunt in petiolis rigidis ac superiora versus obliquè surrectis, qui bini & bini in adversis partibus supra ex origine foliorum erumpunt ac singuli passim in tres minores ramulos curtos, brevèque mutuo dividuntur, suntque in singulis petioli ramis quini congregatim insidentes, odore dulci & delectabili optimum mel æmulante, interiùs & exteriùs albicante & aqueo colore, sex, septem, octo foliis constantes, suntque folia ad petiolum strictiora, versus summitem lateribus rectis dilatata, atque duabus lacinii brevibus excurrentia, ac anteriùs inter lacinias sinuata, & exteriorem versus partem oris rigidè inflexa, contextura tenuia ac rigida, in sole valde coruscantia, venulis vix conspicuis, nisi in parte ubi colore albicante attrito membranaceæ sunt pelluciditatis.

Sunt autem *Pediculi Florum*, quibus ex calyce oblongo, profundo,

P

viridi

viridi ac qui rotunda supernè ora est, emicant vaginulae breves, semiunciales, crocei, aureique coloris, in hisce duo stamina flava, quae apicibus surrectis, crassis & flavo-albicantibus dotata, sunt inserta; pediculi florum siccati croceum odorem recipiunt, iisque indigenae cum ligno sandali mixtis atque tritis corpus inungunt.

*Fructus* sunt rotundo-plani ac compressi, colore viridi, in medio una futura extuberante ad verticem utrinque perducti.

In iis duo rotunda compressa *Semina*, quae utrinque sub cortice extuberant intersepimento medio à se mutuo distincta.

*Apud hosce Medicos non est in usu.*

## F I G. 21.

Diu anceps hacti, an eadem foret hac arbor, cum *Arbore styli sive Myrti C. Bauhin.* Arrisit *Brasiliensem Paricetace* non male convenire videbatur: tum etiam *Clasii* descriptio, ex *Fabricii* relatu deprompta: praesertim cum ea quae de florum pediculis, colore, odore, & usu reliqui addunt Autores, non inconcinne cum nostrorum descriptio-

ne conveniant. Obstat tamen defluxus florum *Arbore styli* de die, cujus nulla hic sit mentio: Verum cum *Fabricio* & *Paladino* testibus, illud eos duntaxat concernat flores, ad quos solares radii pertingere possunt, minoris facienda videtur hac difficultas. Interim mihi vix satisfacio, aliorumque iudicio subscribo.







*Pinna. lat.*

കൊമ്പ. mal.

പിന്ന. Arab

बायो. bra.





## CONN A.

FIG. 22.



*Onna*, lingua Bramanum *Bajo* est arbor procera, <sup>Fig. 22.</sup> unius hominis altitudine, ramis densis & opacis latè sparsis.

*Radix* cortice fusco ramos transversos spargens.

*Caudex* ambitu amplexum unius hominis excedens, cortice cinereo, ut & furculi vetustiores, novelli, virides; cortex adstringens & subamarus.

*Folia* in furculis teneris, viridibus, petiolis brevibus, rotundis, ferme bina & bina cum uno in vertice proveniunt, suntque oblonga ad petiolum lata curvitate, inde anteriùs ad cuspidem stricta, mediocri crassitie, mollia, densa, superficie lenia, glabra & plana.

Ex *Costa* media, quæ in adversa parte eminet nervulis subtilissimis, inter quos venularum contextus cancelliformes minutissimi intercurrent, striata, viridis & nitentis in recta, in adversa clarioris & furdi, sapore subdulci & subamaro.

*Flores* in furculis viridibus, rotundis, duas spithamas longis, qui supra ex origine furculorum foliaceorum erumpunt, proveniunt petiolis longiusculis, triuncialibus, tenuibus, rotundis, viridibus hinc inde appendentes; sunt autem flores flavi quinque foliorum oblongo-rotundorum & nonnihil crispatorum, quæ inferiùs angustis unguiculis sunt, ac ex vena media latiore venis obliquis sunt striata, tria ad unam partem sunt minora, quæ ex adverso, paulo majora.

*Stamina* in medio decem, tria majora flava, incurvata & lata, cum grandibus apicibus seu lingulis flavo-fuscis, inflexa versus tria folia minora, septem minora flava cum grandibus apicibus seu semibifidis flavo-fuscis linguis versus duo folia majora inflexa; ex medio longum silicarum viride germen prodit, verum non ex omnibus floribus.

*Calyx* quinque viridi-dilutorum cuspidatorum foliorum.

*Siliqua*, quæ floribus deciduis succedunt, sunt oblongæ, rotundæ, rectæ fistulæ seu cannæ dictæ, *Cassia* fistulæ, duas spithamas & amplius longæ, cortice exteriori viridi, interiori albicante, & lignoso, seu potius cartilaginoso, duro constantes, interius distinctæ in sua loculamenta per orbiculos cartilaginosos, rotundos, transversos ac parallelos, qui cortici interiori affixi & in medio rectæ fissura ad eandem corticis partem striati; intus in hisce cannis orbiculi cartilaginosi pulpa subdulci, quæ primùm albicans, dein flavescentes, post

Q

rubro-

rubro-nigricans, obducti sunt; in pulpâ *Faba* involutæ sunt, quæ forma oblongo-rotundæ sunt adjacentes orbiculis cartilaginosis ex inferiori parte & cum sua longitudine respondent longitudini fissuræ.

*Faba* teneræ, cortice albicante & candido sunt, intus pulpa viridifubacida, quæ carne pellucida & nervosa circumdata est, saporis nullius nisi sylvestris; cum maturæ ac siccæ sunt, duro rubro-fusco cortice obductæ.

## V I R E S E J U S.

**C**ortex & Folia contrita ac mixta cum oleo conducunt in peruncione partis affectæ pustulis. *Faba* in Decocto datæ ventrem laxant ac purgant per inferiora. *Earum farina* usurpatur pro cataplasmate.

## F I G. 22.

Exhibetur hic ab Autoribus nostris *Cassia Fistula Alexandrina* C. *Banksii*: quæ cum nascitur variis in regionibus, varia inde sortitur nomina. In *Aegypto*, unde copiosè quaqueversum diffunditur *Fistula*, *Almu* & *Paludans* testibus, vocatur *Chasimber*, in *Arabia* *Tappacagnina*, in *Mexico* *Guahyobanili*, *Canaria* *Hafayata* & *Esayaga*, *Guatatempsi* *Gramela*, *Arabia* *Cassafala*, *Malabar* *sihu* juxta Auctores nostros *Cassa*, & ex *Angla* testimonio *Cordaca*, *Brasili* *Bojo*, vel ut alii volunt, *Babus* & *Baba*, in *Zenit* ubi copiosè crescit, à *Cingalesibus* vocatur *Athala*. Circa floris descriptionem nonnihil variant Auctores, dum alii incarnatos, alii sucros, alii flavos describunt, ut & illi sunt, quos hoc anno ex *Zenit* accepti, perperantibus pluribus venuli purpureis.

Hic in regionibus, semen terra mandatum, ad pedaleon quandoque excrevit altitudinem, verum ingruente hyeme, omnem respuit culturam, & emoriatur, ut non siccis sum expectus.

Præter autem hunc *Cassiam vulgarem*, & *Brassianam* à *Loele* in *Pharmacopœia Rostetiensi* restructa exhibitam, alia quoque datur, à nullo Botanicorum hæcenus descripta, quam *Cassiam Americanam* *Fabaceam* nominare lubuit: Siliquarum enim loco lobos longiusculas & vulgaribus non dissimiles profert, quibus continetur *Papæ* ejusdem ferme cum vulgari saporis & efficacie: ipsi arbor *Kadus* sicutur crassa, rotunda, quæ in plurima filamenta cortice nigricante obducta definit: *Cortex* cinereus est coloris, scaber, subtiliorque medulloso, quem *Kamali* inordinatè seminant, foliis vestiti subrotundis, ex glauco viridibus, brevissimisque pediculis donatis: *Floris* videre non contigit: *Semen* quodd pulpe involuitur, subrotundum est, compressum, & nigricans, pili minoris magnitudine, ex *America* *Inju*, quos Galli *les Anillo* vocant, allatum.







*Balam pulli. Lat.*  
 വാളംപുളി *Mal.*  
 غلظم بجوي *Arab.*  
 बिल्व *bra.*





## B A L A M - P U L L I .

seu MADERAM-PULLI.

FIG. 13.



*Alam-Pulli* seu *Maderam-Pulli* ling. Bramanum Fig. 13.  
Sinza . . . est arbor grandis ramis densis in larum  
diffusis.

*Radix* crassa brachia latè diffundens cortice ru-  
bescente.

*Stipes* crassus ambitu duorum hominum am-  
plexum aequans cortice crasso sub crusta nigricante  
& cinerea-rubescente uti & rami vetustiores. Folia in petiolis seu fur-  
culis tenuibus, viridibus, interiùs sulco striatis, nondum spithamam  
longis, qui ad exortum viridi-diluto tuberculo parum turgescunt, bi-  
na & bina in duabus seriebus proveniunt, iisque insident cum ante-  
riori parte nonnihil versus summam petiolorum conversa, &  
petiolorum cum suis superficiebus obliquè secantia; suntque folia par-  
va, oblongo-angusta pollicari ferme longitudine, latitudine ferme  
semidigitali & ubivis uniformia, nisi quod ad posticam partem paulò  
latiora quàm anteriora versus, anteriori ora rotunda, contextura non-  
nihil tenuia & solida, superficie plana, viridis fusci, in adversa dilu-  
tionis, saporis acidi, in adversa parte in medio nervus parum eminens,  
atque ex eo venule subtilissimæ in se invicem incurrentes exeunt in  
adversa tantùm conspicuæ.

*Flores* qui congregati octo, decem, plus minus in petiolis viridi-  
bus, qui ex origine petiolorum seu furculorum foliaceorum oriuntur,  
proveniunt, constant septem foliis colore differentibus, cum quibus  
calyci crassulo & rotundo insident, ac odoris nullius; ex foliis qua-  
tuor quæ exterius sita sunt colore in totum candido, postmodum  
parum subflavescentia, suntque oblonga, anteriùs cuspidata, tenuia,  
nullis venulis striata, tria quæ supra ex horum foliorum unguiculis ad  
unam partem prodeunt ac interiùs sita sunt, anteriora versus magis  
rotundiola, in oris tenuiter crispata, & inter colorem album qui  
etiam in adultioribus subflavescit, venis rubris variegata, suntque eo-  
rum duo reliquis majora puta longiora & latiora, atque tertium in-  
ter illa duo intermedium surrectum est & minusculum ac anterior  
cuspidè parvo subflavo eminens, orisque interiora versus contractis  
seu cochleato-cavum.

E medio stamina viridia exsurgunt tria incurva quæ prius in unum  
juncta sunt, post divaricantur respicientia folium surrectum, duo

R

horum

horum exteriora excepto intermedio apicibus dotata sunt, qui primum flavi, postea cum folia subflavescent, rubro-fusci coloris.

Cum hisce simul emicat unus stylus viridis incurvis staminibus crassior inter stamina & folium surrectum prodiens, qui filiquosum germen est.

*Gemmae Florum* rotundiolæ sunt, in una parte planæ, in altera magis convexæ, primum rubro-saturæ, dein cum rotundo-oblongiores sunt, colore viridi-albescente.

*Fructus*, qui in lignosis ac crassiusculis petiolis ramis appendent, sunt filiquæ oblongæ, crassæ, in glandulas tres quatuorve extuberantes, constantes cortice crassiole qui exterius est rufi seu muscosi coloris, intus viridis & carne intus acerba, quæ primum humida, duriola & albicans ac subviridis est, cum maturi sunt, mollis & flavo-seu rubro-fusca, suntque ad corticem ex petiolo lignosis filamentis sed raris per carnem in longum pertexti & sub carne in membranacea loculamenta in quibus fabæ confitæ sunt, distincti.

*Fabæ* quadratæ & planæ, primum cum immaturæ sunt, cortice viridi-diluto & nitente, intus sub cortice pulpa sunt alba, candida, densa seu solida, sapore, cum teneræ sunt, adstringente & corticis amari, maturis filiquis in osseam duntiem cortice rubro-fusco evadunt.

*Flores* hæc arbor semel in anno dat in Novembri.

#### V I R E S E J U S.


**I**N Febribus ardentibus, malignis & pestilentialibus confert, ad quod sæpe cum saccharo condita datur, ab indigenis creberrimè usurparur in medicamentis purgativis præcipuè tempore æstivo, ut & maximè ubi bilis flava redundans ac se per corpus undique diffundens, sanguinis ebullitio, siris infecta, morbi cutanei & præsertim morbus regius grassantur, in quibus malis simplex medicamentum ex cassia fistula cum tamarindo unà cum saccharo vulgo dicto Jagra de Cana datur, quod leniter alvum laxat ac purgat. *Cortex* tritus & cum aqua oryzæ in unctionem corporis permixtus humoribus superfluis dissipandis confert.

#### F I G. 23.

Arbor hic describitur est *Siliqua Arabica*, quæ *Tamarindus* C. Bæboni; *Tamar* sive *Dalphyus Indorum*, *Palmyra Indica* & *Desfide Arabum*, *Brasilienfis*, *Pijne* testæ, *taraj*, *Guzuratenfis* *Amboi*, *Cancrinis* & *Malabarensibus* juxta *Acofiam*, *Chiuha* & *Pai*: *Madagascensibus* *Mame* dicitur. *Faba* Sole occidente eodem modo ut in *Aracis*, aliisque sese contrahere

solent, eoque oriente aperire, ut & in plantis apud nos notis, sed quæ nunquam perennarunt, non semel experti sumus: quod autem & ipse fructus sive siliqua, frigoris vitandi causa, solis sese involvat, fabulam redolet. Qui plura sentem de hisce velit, jam citatos adeat auctores, & imprimis *Alpinus* de plantis *Ægypti*.







Coddam-pulli. *lar.*  
 കൊടം പുളി *mal.*  
 قودام حوتبي *Arab*  
 दामाओ *brah.*





## C O D D A M - P U L L I.

FIG. 24.



*Oddam-Pulli* seu *Orà-Pulli*, ling. Bram. *Dàrambò*, est Fig. 24.  
arbor procera, nascens in arenosis, densis & opacis  
frondibus latè sparsis.

*Radix* crassa brachia seu ramos subtrus ac super  
terram latè diffundens, cortice albicante-subflavo,  
qui crusta nigricante obductus est, & sub eà rubescit, ligno albi-  
cante & subflavo incisa perviscosum humorem qui saporis est nul-  
lius, exudans.

*Caudex* ambitu duorum hominum amplexum implens, cortice  
quoque eodem ut *Radix*, ligno albicante.

*Folia* in furculis bina & bina petiolis brevibus, viridibus, inte-  
riùs planis proveniunt. Suntque oblongo-rotunda, anteriora versus  
in cuspidem angustam, quæ versus unam partem nonnihil inflexa est,  
contracta, ad petiolum quoque stricta, cum oris versus exteriora  
nonnihil inflexa, suntque contextura crassa, spissa & solida, viroris  
in recta fusci & nitentis, in adversa clari.

Ex *Costa* media quæ in adversa altè extuberat & tenuiter in recta,  
venulæ procedunt obliquè anteriora versus quæ folium subeunt, &  
in adversa parte sub exteriori folii cuticula tenuiter prominent; præ-  
ter eas nullæ aliæ venæ sunt conspicuæ; foliis sapor est acidus.

*Flores* in vertice furculorum foliaceorum brevissimis pedunculis  
insident, suntque incarnati seu rosaceo-saturi & flavescentes, con-  
stantes quatuor foliis rotundis, parùm oblongis & versus interiora  
cochleato-cavis, suntque folia crassa & densa sine venis intus magis  
flavescentia & exterius ad oras; in medio florum emicat globulus vi-  
ridis rudimentum fructus in octo latera oblonga per strias distinctus,  
in vertice, capitulo seu umbilico, quod ex gemmis albicantibus con-  
stat, quæ velut ad eandem orbitam extenduntur, obsitus, estque cir-  
cumdatus staminibus surrectis albicantibus, quæ in vertice flavo-ru-  
bris nodulis dotata sunt; flores odoris nullius & saporis subacidi.

S

*Calyx*

*Calyx* est quatuor viridi-dilutorum flavescantium, cochleato-ca-  
vorum foliorum.

*Fructus*, qui uncialibus petiolis appendent, grandes sunt, rotundi  
octo, novem, decemve costulis extuberantes, ac in vertice capitulo  
parvo, quod etiam costulis striatum est, emicantes, primùm virides,  
dein flavescences, cùm maturi, albescences, sapore acido-dulci.

In medio pulpæ *Semina* cum sua longitudine in longitudine fru-  
ctus confita, oblonga magnitudine unius articuli compressa, colore  
cœruleo-nigro.

Hæc arbor *Flores* & *Fructus* semel in anno dat, in *Martio*.

*Apud hosce Medicos non est in usu.*

F I G. 24.

Eadem est hæc arbor cum *Frutilla* male *auræ amulo*  
*C. Benth.* sive *Carcapali Acosta*. Perperam tamen con-  
fundit *Bauhous*, *Carcapali Acosta*, & *Carcapali Lincol.*  
Quod manifestò liquet, si quis utriusque descriptio-  
nem examinet. *Acosta* enim qui *Carcapali* quoque *Cana-*  
*ria* vocari assensit, fructum hujus arboris, malo aureo  
similem tradit. *Lincol.* autem, fructum *Cerasi* magni-  
tudine describit.

Quod ut distinctius patet, lubet hic adscribere ver-  
ba Domini *Mermæ*, qui literis, anno præterito, *Ca-*  
*lambo* datis, unâ cum harum Plantarum foliis & flori-  
bus ad me transcripsit: *Arboris* (inquit) *Indica* sunt *folia*  
& *fructus*, quæ *Gummi Gotta* sanctis, fructu acido, sulci-  
to, aureo, malo magnitudine, *Carcapali Acosta*, *Giberaka*  
*Cingalensium* dicit. Mox subiungit: *Hic* adde *folia* &

*fructus* alterius speciei, *Arboris* nempe *Indica* quæ *Gummi Got-*  
*te* sanctis, fructu dulci rotundo, cerasi magnitudine, *Carc-*  
*pali Lincol.* (NB. quod *Bauhous* in *Pinaco*, utramque per-  
peram comprehendit, sub una specie, *Carcapali Acosta*, &  
*Carcapali Lincol.* Different enim inter se *fructus* ac *fructus*, li-  
cet utriusque conveniant, *Cingalensium* vocatur *Kanna Gha-*  
*raka*, id est, *Giberaka* datus: hinc hæc arboris ex trunca  
secto *Gummi Gotta* fundunt, pressas autem illas quod ex  
*Kanna Gharaka*.

Confundi tamen neutiquam debet *Gummi Gotta*  
hic descriptum, cum vulgari, quod ex *Isula In-*  
*dua* affini Planta, colligi testatur *Bauhous* Cap. LVII.  
& ab Indis vocari *Lanum Cambodja*, quod in *Cam-*  
*bodja*, vicina *Chine* regno Provincia, frequenter  
proveniat.



ATT-





*Ami-ala. Lat.*  
 അമിയാലാ *mal.*  
 عَمَلِيَّة *Arab.*  
 एमली *bra.*







## A T T Y . A L U .

FIG. 25.



Lu quatuor sunt species, *Atty-Alu*, *Irry-Alu*, *Aréa-Fuas*, *lu*, *Perálu*.

*Atty-Alu* lingua Btamanum, Roembadoè, est arbor procera, densis & opacis frondibus latè sparsis, nasciturque in arenosis.

*Radix* crassa radicales plurimas fibrosas tam subtus, quàm super terram longè latèque diffundens, cortice lacteo, qui sub crusta nigricante ex albo rubescit, ac incisus seu detractus pleniori rubedine celeriter perfunditur, brachio inciso aquam limpida & insipida ac subrubram saporisque frigidi ubertim exhibet, quæ vase supposito excepta suo usui asservatur.

*Caudex* crassus, amplexum unius hominis ambitu excedens, cortice crasso, coriáceo ac lacteo, qui à ligno detractus seu incisus intrus ex colore albo quoque nonnihil rubescit. *Surculi* teneri virides, geniculati.

*Folia* quæ in ramis ac surculis petiolis mediocriter longis, crassis, rotundis, & interiùs tenuiter striatis proveniunt, oblongo-rotunda longitudine ad latitudinem, quæ in medio maxima est fere dupla, ad petiolum oris rotundis anteriùs in cuspidem leniter contractis, suntque tenuia, mollia, glabra & lenia, virore in recta parte fusco & nitente, in adversa autem claro: nervi in quibus viror dilutior est, ex costa crassiola, quacum in parte adversa eminent, obliquo ductu anteriora versus exeunt, ac proximè ad marginem reflexi minoribus arcubus in se invicem deferuntur, ac inter hosce venis transversis folia cancellatim densè & subtiliter percontexta sunt; sapor foliis adstringens, odor nullus nisi sylvestris: in vertice surculorum conus oblongus & viridis inter foliosa involucra viridia folia tenella recondens.

*Flores* fete nullos uti nec ceteræ species.

*Fructus* in ramis ac surculis petiolis curtis, crassiolis, nonnihil incurvis, tum etiam in ipso corpore plures congregati proveniunt, suntque plano-rotundi, ac ad petiolum contractiores, nonnihil pilosi cum umbilico in vertice haud dissimiles nostris ficis, cum immaturi sunt, virides ac lacteo liquore, ut & in petiolis; maturi, colore rubicundo & minus lactei; suntque in eduliis.

In hisce fructibus ut in ficis *Grana* parva, tenuia, oblonga, numerosâ serie continentur, constantia ex capitulo rotundo & recta cau-

T

dula,

dula, quacum ordine cortici interiùs insident, suntque instar folliculorum in suis capitulis unum semen minutum nigricans tcondentia, primùm albicantia, ex maturitate subflavescentia.

Fructibus cùm maturescunt *Formica* innascuntur, hosque naturales habent in eduliis; non verò eos qui aliarum sunt specierum.

Bis terve in anno hæc arbor dat fructus, uti & cæteræ species, quæ omnes, ut indigenæ ferunt, non alio modo propagantur, nisi è seminibus fructuum à corvis depastorum, quæ cum suo stercote deponunt.

## V I R E S E J U S.

**R** *Adicis* decoctum epotum servit ad putificandum sanguinem & hepar, reprimitque coleræ acrimoniam; ejusdem decurtatæ succus exstillans qui in vase supposito excipitur, etiam hepati male affecto convenit, confertque iis qui manus habent sulcatas & fissas. *Cortex* ardoribus hepatis restinguendis in decocto datut, atque hoc modo usurpatus etiam iis servit qui in ore aliisque partibus sulcos habent. *Idem* tritus ulceri cuique proficuè apponitur, uti & parti laboranti morbo sacro Lusitanicè dicto, *Cobrella*. *Foliorum succus* cum oleo decoctus in febre calida conducit, si vicibus itetatis corpus & caput cum eo lavetur. *Fructus* alvum adstringit, estque comestus proficuus pro pituita humorumque mala temperie corrigenda.

## F I G. 25.

Proponantur hic ab Autoribus quatuor sicum | quentibus nominibus insignire placuit. *Atty*-*ala* ergo  
*Malabarica* species, quas utpote à vultu descriptas | nobis erit *Ficus Malabarica* suis oblonga, acuminata,  
 (& forsan huic regioni dantisat familiaris,) se- | fructu vulgaris *anole*.



ATTY-









## I T T T - A L U.

FIG. 16.



*Try-Alu* quæ secunda species *Alu* est, lingua Bra-  
manum, *Aréca-Gôli*, arbor quoque procerâ est, ac  
minor cæteris speciebus, densis & opacis frondi-  
bus larè sparsis.

*Radix* quoque crassa radículas tam subter quàm  
super terram longè latèque diffundens, cortice quoque lacteo, qui  
incisus etiam cum tempore tubescit.

*Caudex* crassus, amplexum unius hominis æquans, cortice lacteo,  
ac cùm detrahitur seu inciditur, intus rubescente, ex ramis hujus ar-  
boris filamenta seu radiculæ versus terram pendulæ demittuntur.  
*Sarculi* teneri virides & geniculati.

*Folia* quæ petiolis brevibus digitalibus adherent, minora cæte-  
ris, facie oblongo-rotunda, rotundisque ad petiolum & anterius oris,  
ac parvâ, angustâ & obtusâ cuspide eminentia, latitudine ad cuspi-  
dem paulò majori, quàm ad petiolum, suntque crassâ, solida, densa  
ac valde nirentia in utraque parte, verùm magis in rectâ, in quâ vi-  
rore sunt valde fusco ac saruro.

E costa quæ in parte adversa maximè eminet; minùs verò in re-  
cta, *Vena* intra folium conspicuæ transversim recto ac satis parallelo  
ductu ordine denso exeunt, atque ad marginem arcuatim concu-  
rentes limbo cinguntur.

*Sapor* *Foliis* adstringens & subamarus.

In vertice fuculorum conus oblongus & viridis inter foliosa in-  
volucra viridia folia tenella viridi-diluta recondens.

*Fructus* qui duo tresve congregati vel solitarii cum supra ad origi-  
nem foliorum, tum hinc inde pediculis brevibus proveniunt, par-  
vuli sunt & rotundi in vertice umbilico eminente coronari, suntque  
etiam, cùm immaturi, lactei ac vitides; maturi verò, minùs lactei,  
colore flavo ac minùs rubescente.

*Grana* in fructibus quoque magna congerie, suntque forma & colore illis prioris speciei similia, at minora, recondentia in seminum nigricans semen.

## V I R E S E J U S.

**C**ortex arboris tritus ac in lacte per pannum exprimendo datus vertigini capitis sedandæ confert. Ulceribus curandis prodest *Foliorum* decoctum cum oleo, si cum eo corpus perungatur; habet quoque hæc easdem vires cum prima, dictis modis, quibus illa usurpata.

## F I G. 16.

Secunda hæc *Ficus* species non inconcinne | densifolia nimirum, foliis parvis, rotundis, co-  
meo iudicio vocabitur *Ficus Malakarensis*, solum | *romana*.



ARBA



THE  
LIBRARY OF THE  
MUSEUM OF NATURAL HISTORY  
AND  
ZOOLOGY  
OF THE  
SMITHSONIAN INSTITUTION  
WASHINGTON, D. C.





Peralu. lat.

ဝေဝေ mal.

يخالو Arab.

यत्र brah.





## A R E A L U.

FIG. 27.



*Realu*, quæ tertia est species *Alu*, lingua Brama-  
num *Bipaloè*, arbor quoque est procera, densis &  
opacis frondibus latè sparsis, nascensque in areno-  
sis & petrosis, ac etiam in arboribus, uti *Itti-  
Alu*.

*Radix* crassa radices fibrosas tam subtus quàm  
super terram longè latèque diffundens, cortice lacteo qui incisus  
etiam rubescit.

*Caudex* crassus, duorum passim hominum amplexum ambitu æ-  
quans, cortice lacteo, qui detractus seu incisus etiam rubescit.

*Surculi* novelli virides geniculati.

*Folia* quæ longis, tenuibus, rotundis, ac viridi-albicantibus pe-  
tiolis appendent forma cordis humani, anteriùs angusta ac longa  
lanceola cuspidata, quæ vetustiora postica parte ad petiolum rectio-  
ribus oris, quæ teniora rotundioribus circumscripta, margine tum  
æquabili tum in arcus sinuato; suntque solida ac densa, minusque  
crassa, quàm illa secundæ speciei, lenia & mollia; at quæ vetustio-  
ra sunt, rigida, in interiori latere virore nitente & fulco, exteriùs  
claro.

Ex costa in utraque parte eminente *Costula* transversæ recto & fer-  
me parallelo ductu anteriora versùs obliquè exeunt ad marginem  
proximè progredientes, ubi arcubus rotundis & simplicibus in se in-  
vicem concurrunt in recta parte maximè eminentes, ac in adversa in  
quibusdam solum conspicuæ, in quibusdam verò tenuiter eminentes,  
inter hæc costas in interiori parte plurimi extantes nervuli cancella-  
tim intertexti folia in ea parte scabra reddentes, ac in adversa instar  
venarum intra folium solum conspicui cum plurimis aliis numerosis  
venulis: suntque folia in margine nervulo tenui & albicante cir-  
cumdata.

In vertice furculorum *Conus* oblongus, viridis, inter foliosa invo-  
lucra viridia folia tenella viridi-diluta recondens.

*Fructus* ramis furculisque supra ad exortum foliorum in nodulis  
bini & bini juncti & uniti arcuè insident, suntque uti illi *Itty-Alu*  
parvi & rotundi, colore quoque minùs rubro, quàm illi *Atty-Alu*,  
suntque illis *Itty-Alu* planè similes cum umbilico parvo, in vertice  
formicis intus carentes.

In hisce fructibus *Grana* quoque numerosa, eadem cum illis

X

*Atty-*

*Atty-Alu* magnitudine, semen minutum nigricans in se recondentia.

Est hæc arbor Deo *Vistnu* sacrata, quem sub ea natum esse & flores sustulisse hi gentiles fantur: estque ex religione ipsorum hanc adorare, muro lapidum cingere, eamque seu lapides juxta positos rubro colore signare, quamobrem ab incolis Christianis *Arbor Diaboli* nominatur.

#### V I R E S E J U S.

**R** *Adicis Cortex* in decocto datus colerae acrimoniam obtundit & sanguinem purificat, estque in febribus fixis & radicatis præfidio. *Cortex Arboris* ad ulcerum sanationem conducit tritus & appositus, ac cum aqua eodem modo adhibitus prodest pro morbo sacro. *Succus Foliorum* expressus, ac cum oleo decoctus, conducit in febre podagrica corpore cum eo peruncto.

#### F I G. 27.

Tertiam hanc speciem non incongruè ap- | *lis confidat, fructu rotundo, parvo, ge-*  
pellendam censco, *Ficus Malabarensem*, fr- | *min.*



PERA-








*Arcalu. lat.*

അലു mal.

عرج الحرق Arab.

അലു bra.





## P E R A L U.

FIG. 28.



*Erālu*, quæ quarta species *Alu* est, ling. Bramanum Fig. 28.  
*Vadboë*, arbor cæteris procerior, densis & opacis  
frondibus latè sparsis, nasciturque in arenosis.

*Radix* crassa radices fibrosas, tam subtus quàm  
super terram longè latèque diffundens, cortice præ  
cæteris lacteo, qui incisus quoque rubescit.

*Caudex* eximia crassitie duùm triumve etiam hominum amplexum  
ambitu æquans, cortice præ cæteris lacteo, qui detractus seu incisus  
quoque intus rubescit: ex ramis ut in *Stri-Alu* filamenta seu radiculæ  
multo numerosiores versus terram pendulæ demittuntur.

*Surculi* teneri, virides, geniculati, pilosi seu lanuginosi.

*Folia*, quæ petiolis mediocriter longis, crassis, planis, valdè la-  
cteis, ac viridi-albicantibus & subtilibus pilis obfritis proveniunt,  
majora & crassiora sunt cæterarum specierum foliis, & quidem cras-  
sitie eximia, forma oblongo-rotunda, anteriora versus rotundiola ac  
rotundis oris contracta, majori latitudine versus petiolum texturæ  
densæ & solidæ, superficie plana, polita ac lenia, in utraque parte  
tomentosa lanugine obducta, in adversa lanugine densiori & lenissi-  
ma, ac *Veluti* seu corii lanuginosi lenitie, virore in recta parte fusco  
& nitente, in adversa claro.

E petiolo cum costa intermedia quæ valdè crassa est, ac hinc in-  
de costulas suas laterales obliquè anteriora versus emittit, utrinque  
duæ *Costæ* exeunt, quæ versus posticam partem folii suas quoque  
*Costulas* emittunt, omnesque ad marginem arcuatim concurrunt in  
adversa parte eminentes, in recta tum conspicuæ, tum etiam non-  
nihil eminentes: inter hæc costas nervuli transversî rariores, qui ve-  
nulis densis ac subtilibus per texti sunt, sparsi. Sapor Foliis adstrin-  
gens, odor nullus.

In vertice furculorum *Conus* est oblongus & viridis inter foliosa  
involuta folia novella viridia recondens.

*Fructus* ramis furculisque supra ad exortum foliorum passim bini &  
bini juncti & uniti, ut illi *Arælu*, arcuè insident, rariùs solitarii,  
suntque magnitudine cum illis *Atti-Alu* eadem, at rotundiores, nec  
non colore maximè intensè rubescente seu incarnato saturo; cùm  
maturefcunt, tomentosa lanugine obducti, cum umbilico parvo  
in vertice.

In hisce fructibus grana quoque numerosa congerie, magnitu-  
dine

dine eadem cum illis *Atti-Alt* in se semen minutum nigricans instar folliculorum recondentia.

*Vadhoè* Bramanes grande, atque adeò hoc nomine velut per excellentiam notant grandem arborem, uti hæc, utpote cæteris speciebus prægrandior.

V I R E S E J U S.

**L**iquor *Radicum* seu filamentorum, quæ ex ramis deorsum pendent, cum aqua simpliciter epotus, vel in decocto datus mitigat dolorem febrilem purificatque hepar & sanguinem. *Cortex* arboris tritus proficiuus est pro morbo sacro parti affectæ appositus. Ablutio corporis cum *Corticis* decocto in febre confert.

F I G. 23.

Quartum hoc ficum genus, non immerito dicitur  
*Ficus Malabarica* solum *crassiuscula*, *majori*, *fructu* *gravi*,  
*intensi* *robore*.

Si autem alicui placuerit, aliquas ex hisce speciebus,  
ad *Syriacum* referre, non malè quoque illud fieri  
posse, libenter sentiam.







*Papaveri. lat.*

පු පාටි මල් *mal.*

حَوْثِيَّة *Arab.*

वर्चिकापुष्प *brahm.*







## B U P A R I T I.

FIG. 19.



*Arati* quatuor sunt species, *Pariti*, *Bu-Pariti*, *Schem-Pariti*, *Cadu-Pariti*. Fig. 19.

*Bu-Pariti* lingua Bramanum *Valli-Cari-Capoësi*, est arbor excelsa, nascens in arenosis, densis opacisque frondibus, cottonam valde gratam efformans, idque maximè quod ob puritatem nullis formicis neque muscis infestetur.

*Radix* pinniformis plurimis capillatis fibris terræ se affigens.

*Caudex* amplexum unius hominis superans ligno albicante est minus duro & solido, quemadmodum illud abietum, verum nullis venis undulatis, quod adaptatur ad conficienda instrumentorum musicorum opercula, intus in ligno corculo molli; ejus cortex est ut cortex tiliae, cum quâ in multis ut forma, amoenitate & viriditate convenit, estque lignum & cortex nullius odoris, neque saporis, nisi sylvestris & adstringentis.

*Folia*, quæ tenerris furculis, sive ii ex vetustionibus ramis è latere, sive ex eorum superiori parte erumpunt, petiolis longis, rotundis, viridibus, tenuibus appendent, sunt forma cordis humani, magnitudine unius palmi & amplius, antè lanceola oblonga & angusta, cuspidata, contextura mollia & solida, superficie plana & glabra, viridis communis & parum nitentis, in parte adversa dilutioris, odoris & saporis nullius nisi sylvestris.

Ex petiolo cum costa media utrinque *Costæ* tres exeunt, quæ antè progressæ ad oras folii excurrunt, ubi inter subtilissimos venularum cancellulos ac tractus disparent, suos ramulos laterales versus marginem dimittentes, suntque costæ etiam in recta parte eminentes, licet magis in adversa.

*Flores* qui longis quoque petiolis supra ex origine foliorum proveniunt, sunt campanæ quinque oblongo-rotundorum foliorum calyci arcto, rotundo, profundulo & crasso ac viridi-fusco, qui quinque minutis apicibus in ora eminet, infidentes, coloris ex albo flavescentis, qui nonnihil ad virorem vergit, odoris nullius; folia supra se invicem convoluta sunt exterius venis seu nervis eminentibus in longum striata, & ad idem latus in parte inferiori valde aspera, suntque ad calycem crassiola, anteriora versus tenuia, rugis valde crispa & contracta, & cum unguiculis versus unam partem inflexa; inferius in collo flores rosa insigniti sunt purpureo-rubicundo-fusca quin-

Z

que

que foliorum, quæ singula in singulis unguiculis foliorum distinctè notata sunt.

Ex medio exurgit *Stylus Columnaris* striatus, albicans, circumdatus infra apicem penicillo numerosorum stamenculorum, tenuium, albicantium, quæ flavis lunularibus apicibus dotata sunt, ac apice quo extra penicillum ferme digito transverso emicant tortuose inflexo.

*Gemma Florum* conicæ sunt post aperturam flores ex albicante magis & magis flavescent, & spatio trium dierum fusco-rubescunt, ac tum foliis contractis & clausis sunt, atque cum eo colore emortui ex calyce decidunt, unque fronde per totum annum floribus numerosis adornatæ.

Floribus deciduis *Capitula* flavo-rotunda ac quinquangulata conspiciuntur, quæ in calyce florum profundè confita sunt, habentque latera nonnihil introrsum inflexa; capitula hæc incisa flavum, gummosum liquorem qui *Gutta-Gamba* similis, saporis autem & odoris debilis ac sylvestris est, exsudant, suntque per intersepimenta intermedia in longum distincta in quinque capsulas quæ singulæ per intermediam eminentem corticis futuram in duo loculamenta divisa sunt.

*Semina*, quæ in iis confita oblonga sunt, trilatera, uno latere rotundo in quo argenteo lanuginoso cortice circumdata sunt, suntque colore spadiceo-fusci cum nucleo albicante in medio.

*Flores* hæc arbor fert toto anno ubere proventu.

#### V I R E S E T U S.

*Folia* ulcerum sanationi serviunt iis applicata.

#### F I G. 29.

Sequentes hæc plantas *Alsea* esse species, nemo vel mediocriter in Botanicis exercitatus, inficius debet.

Sed miros Auctores quatuor proponere, cum tres tantum describant, & totidem Icones exhibeant. Prima ergo nobis erit *Alsea Malabarica*, *Alseis folia*, *Alsea majore*, ex alba flavescente. Sed quid interim de *Alseis*

*Indica Cameræ*, cui florem magnitudine rose sylvestris albicantem, interius luteum adscrisbis, statuentum? Ut verum fatear, magnam videtur habere cum hac & sequenti Planta affinitatem, & nisi florum obflares figura, quam in Iconibus exhibet *Camerarius*, majori cum audacia certi aliquid pronuntiare possem.





Parili lat.  
 പ മ തി mal.  
 يَغْرِخَطِي Arab.  
 कारिकापुरी fran.





## PARITI, seu TALI-PARITI.

FIG. 30:



*Pariti*, quæ secunda species est ling. Bramanum <sup>7438</sup>  
*Cari-Capsi*, est arbor altitudine trium ferme homi-  
 num.

*Radix* fibris suis capillaceis in latum se diffun-  
 dens.

*Caudex* crassus amplexu unius hominis ambitu minor:

*Rami* fusci cortice interiore viridi.

*Folia*, quæ in nodis solitaria, vel cum novellis supra suum exortum ramis in petiolis mediocribus, rotundis, crassioribus, viridibus & in recta parte etiam rubescentibus proveniunt, sunt forma cordis humani latioris & rotundioris, in summitate oblonga-angusta cuspide eminentia, in postica parte ad petiolum oris per incisuram diductis, in margine tenuissimis crenulis, contextura solidiora & crassiora, in recta parte viridi-fusciore, in adversa viridi-clarissima & albicante, lanuginosa seu tomentosa ac lenia instar *Veluti*.

Cum costa media, ex qua costulae ferme binæ & binæ exeunt ex petiolo tres utrinque *Costulae* egrediuntur, quæ ramos suos seu costas transversas versus marginem emittunt, ex hisce tribus ea quæ costæ mediæ proxima est arcuatim alte ascendit, suntque costæ in se invicem arcuatim incurrentes cum costis minoribus versus marginem superimpositis, & ex se ramos seu nervulos transversos, qui mutuo inoculantur, diffundentes, ac cum iis solum in adversa parte eminentes.

*Flores* qui in superiori parte furculorum supra ex origine foliorum petiolis uncialibus crassis & viridibus proveniunt, sunt etiam campanulae quinque foliis parum rotundis constantes forma & colore quoque similes iis *Bu-Pariti*, verum hi minores sunt, & in exteriori parte subasperi, nec tantopere se crispant ac corrugant, suntque in inferiori parte colli non rosa quinque foliorum, sed macula grandi rotunda, purpureo-rubro-valde fusca notati.

A a

E me-

E medio maculae purpureae exurgit *Stylus Cylindraceus*, qui albicantibus & subflavis gemmulis seu glomis est circumdatus, in summitate, qua supra glomos emicat, nodo oblongo-crasso & purpureo-rubro & valde fusco extuberans.

*Calyx* est quinque foliorum viridium oblongo-cuspidatorum quae in medio costa eminente in longum striata sunt, ac à decem minoribus cuspidatis foliis arcte comprehenduntur, constatque pede crasso, digitali, qui inferius duobus parvis cuspidatis & viridibus foliis ad inflexuram petioli, cui annexus est, succingitur.

*Flores* hi quoque rubescunt.

Floribus deciduis ex calyce erumpunt *Capitula* oblonga-rotunda à foliis calycis, quae tum colore Persico sunt, ferme in totum comprehensa, suntque haec capitula pilis minutis albicantibus obsita, in longum quinque lineis seu sulcis striata, ac in quinque capsulas feminales per membranas intermedias distincta.

#### V I R E S E Y U S.

**F**lores triti cum lacte mulieris auribus induntur pro doloribus capitis.

#### F I G. 30.

Secunda haec species nuncupanda videtur *Alice Malabarica*, *Almili folio*, *flore minus ex alio flavescente*, *exteriori subsapere*.

Debuisset autem, ut ante monui, subsequi *Athem-Perisi*. Verum cum nec descriptionis nec figuræ ullum invenerim vestigium, nihil est quod de eo referam.








Cudu-parili. lat.  
 കൂടുപരികു mal.  
 قحور خرفه عربي Arab.  
 കാപ്പട lemn.





## CUDU-PARITI.

FIG. 31.



*Udu-Pariti*, quæ species *Pariti* lingua Bram. *Capus-fig. 31.*  
*fi...*, est arbuscula altitudine duorum hominum  
 nascens in arenosis.

*Radix* pinniformis cortice albicante fibras emit-  
 tens.

*Stirps* duos in ambitu palmos crassus evadit, cor-  
 tice est communi cum corculo in medio ligni.

*Folia* sunt instar manus in quinque digitos seu foliola oblongo-  
 angusta & cuspidata, incisa, quorum medium magis oblongum,  
 dein illud quod medio proximum, suntque crassitie mediocri, ad  
 tactum nonnihil lenia, utrinque viroris nonnihil fusci.

E petiolo quinque *Cossæ* viridi-albicantes exeunt, quæ singulæ in  
 cuspidem foliorum incurunt in adversa parte solum eminentes, &  
 in recta tantum nonnihil proximè ad petiolum ac venulas tantum  
 subtiles intra folium transversim mittentes, ac inter eas utrinque sub-  
 tiles venæ lacunosa denso cancelliformi contextu sunt.

*Flores* qui in summitate furculorum brevibus petiolis proveniunt,  
 sunt quoque campanulæ quinque foliorum oblongo-rotundorum  
 ejusdem formæ cum illis priorum specierum, suntque etiam colore  
 ex albo flavescente, sed qui magis ad virorem vergit, minores cæ-  
 teris, in adversa parte vasis minus eminentibus striati, minimè verò  
 asperi, minùs quoque se crispant, in inferiori parte colli in umbilico  
 rosa purpureo-rubro-obscura notati sunt.

In medio emicat *Stylus* albicans penicillo stamunculorum tenuium  
 & rubrorum, quæ gemmis flavis & lunularibus dotata sunt, circum-  
 datus cum superiori parte albicante extra stamunculorum penicil-  
 lum eminens.

*Calyx*, cui insident, rotundus, arctus, viridi-albicans, & pun-  
 ctulis viridi-fuscis notatus, ac ad inferiorem partem tribus foliis viridi-  
 bus, grandiusculis, oblongis, cuspidatis, quæ singula quatuor, quin-  
 queve cuspidibus anteriùs eminent, ac nervulis in exteriori parte in  
 longum striata sunt, circumamictus.

*Gemma Florum* cuspidatæ & conicæ sunt, suntque etiam flores hi,  
 postquam per aliquod tempus aperti fuere, rubescentes ac coloris  
 rubro-perfici, pellucidi ac nitentis.

*Capsule Seminales*, quæ floribus deciduis è calyce prodeunt, sunt  
 trilatæræ & in summitate strictæ ac cuspidatæ, lateribus nonnihil ro-  
 tun-

B b

tun-

tundiolis, viridi-dilutis, quæ punctulis lacunosis, viridi-fuscis effossa ac in angulis sulco striata sunt, in inferiori parte à calyce arctè apprehensæ, constantque corticè crasso ac duriolo, qui odoris est instar fructus *Mangæ Indicæ*, in iis tria loculamenta sunt per intersepimenta membranacea, quæ singula è medio cujusque lateris oriuntur & in medio stylis lignosis concurrunt à se invicem distincta, continentia singula in se tria quatuorve semina ac densa filamenta candida, lanuginosa, quæ semina arctissimè & densè involvunt.

*Semina* oblongo-rotundiola sunt colore in cortice primùm albicante, deinde fusco, nucleo intus albicante qui est saporis nonnihil ardentis & subacris.

Ex filamentis candidis *Gossypium* conficitur.

Toto anno *Flores* fert.

#### V I R E S E J U S.

**F***olia* trita & cum lacte vaccæ in unctiōe capitis adhibita somnum conciliant, atque eodem etiam modo sedant dolores capitis ac ejus veriginem. *Fructus* triti & in aqua epoti fluxui dysenterico sistendo conferunt serviuntque pro sulcis oris.

#### F I G. 31.

Posterior hæc species nobis vocatur *Alca Malabarensis* *Pentaphylla*, flores minores ea alio flavesciente, semine trementoso. Quod autem non exiguum cum *Salda-*

*risa* habeat affinitatem, neminem negaturum crediderim, qui utramque Plantam diligentius examinaverit.









*Choranna-mandaru. lar.*  
 ചൊന്നമന്ദാര. *Mal*  
 جيو حاتا مانفارون *Arab.*  
 താമരപ്പഴം *brah.*





## CHOVANNA-MANDARU.

FIG. 32.



*Mandarum* quatuor sunt species, *Chovanna-Mandaru*, Fig. 32. cujus duæ sunt species ejusd. nominis, *Velutta-Mandaru*, & *Canschena-Puu*.

*Chovanna-Mandaru* prima, lingua Bram. *Tambido-Mandaru*, est arbor altitudine quatuor hominum, frondibus densis & opacis latè sparsis, nascentisque in arenosis & petrosis.

*Radix* crassa est, in latum sua brachia diffundens, cortice sub exteriori crusta nigricante-rubro.

*Caudex* unum ferme pedem crassus.

*Folia*, quæ petiolis brevibus exterius rotundis, interiùs planis ac sulco striatis proveniunt, in superiori parte bifida ut caprarum pedes, ob quod à Lusitanis, *Pei de Capra*, nominata, ac interiora versus nonnihil clausa lateribus oblongis ac rotundis, versus anteriora leniter rotunda ora contractis, ac à postica parte rotundæ incurvaturæ, interiùs superficie plana, ac colore viridi-furdo, in adversa colore viridi-subcæruleo, ac in margine nervulo subtili viridi-diluto circumdata.

Ex petiolo *Costula* undecim viridi-dilutæ ac flavescentes excurrunt cum costula intermedia, quæ in fissuræ terminum intrat utrinque quinque ejusdem cum intermedia crassitie, quæ à costa media longius distant, ductu magis inflexo incedunt, omnesque marginem ingrediuntur, committuntque hinc inde mutuo costulas transversas parùm eminentes.

*Flores*, qui petiolis longiusculis & viridi-dilutis supra ex origine foliorum proveniunt, sunt odore fragranti ac rosaceo, quinque foliorum rotundiorum ac parum oblongorum, quæ ad unam partem magis sita sunt, quorum unum quod majus est ac latius, & rotundioris formæ ac surrectum, colore intus purpureo-rubro, ac ad umbilicum floris coloris flavi, purpureis notis hinc inde tincti, venulisque purpureo-rubris variegati, ad oras autem colore magis purpureo-diluto, in superficie exteriori magis albicante; cætera quatuor magis oblonga, colore rosaceo-saturo, exterius diluto, horum duo quæ majori proximè adjacent, interiùs in ima parte sunt colore albicante, reliqua duo interiùs in totum colore ferme rosaceo: suntque folia vcnula intermedia latiori, ex qua venulæ obliquè anteriora versus excurrunt, striata.

*Stamina* in medio quinque vel sex, quæ apicibus surrectis ac viridi-

C c

ridi-

ridi-diluto-flavescentibus dotata sunt, ac versus folium surrectum & variegatum inflexa, quorum duo vel tria, quæ minora sunt, ac magis incurvata, colore candido, tria reliqua colore rosaceo, ac cum iis siliquæ germen in suo petiolo se prodat.

Ad petiolum florum *Unifolium* viride est venulis striatum à parte folii surrecti florem succingens, ac gemmam florum primùm includens.

*Gemma Florum* oblongo-rotundæ, ad summitatem contractiores.

Post flores *Siliquæ* oblongæ valde compressæ, rectæ, glabræ, longæ septem, octovē circiter pollices prodeunt.

*Faba* quæ intus continentur, planæ sunt ac oblongo-rotundæ, colore albo dum immaturæ, dum verò siccæ, colore ruffo seu flavo-rubefcente-obscuro ad spadiceum vergente, jacentque in propriis loculis cum sua longitudine in latitudine siliquarum corneo ac duro intersepimento à se invicem sejunctæ cum parvo umbilico in vertice juncturis laterum siliquarum hærentes.

Toto anno hæc arbor fert flores tempore pluvioso uberiori proventu.

*Schorjanna-Mandaru* Malab. sic dicta à floribus quos rubros habet.

#### V I R E S E J U S.

**R***Adix* in decocto data flatus discutit & lumbricos in pueris enecat, hoc modo sumpta cum saccharo & melle pellit tussim & pituitam solvit. *Cortex* contritus ac cum aqua, in qua *Oryza* lota est, in lotionē adhibitus, humoribus evocandis confert. *Flores* cum saccharo decocti proficuè usurpantur loco sacchari rosati pro leni purgativo.

#### F I G. 32.

Arbores hæc quatuor, foliorum divisurâ imprimis insignes, ab aliis descriptas non invenio. Prioris ramulum siccatum ante biennium ex *Zeilan* Insula transmisit Dominus *Hermann*, addens sequenti inscriptione.

*Arbor Sancti Thomæ. In floribus apparent sanguinea stria, ab efflujo sanguinis D. Thomæ, nata. Devisse creditur D. Thomas in Malabar & Zeilan.*

Minimè verò hæc arborescentem censo, cum *arbores de Sancto Thomæ Insula*, sive *Macere*, cujus Historiam videre licet, lib. *Aromatum* Cap. 211.

Commodè autem primam appellari posse reor *Arbores siliquasum Malabaricam*, sicut insula, sive *perparasum striatæ*.






*Schevanna-mandarū. lat.*

ചവന്ദ്രമാന്ദാര. mal.

چيانتا ماڻدارون Arab.

താമിദാമിദാ gram.







## CHOVANNA-MANDARU.

FIG. 33.



*Chovanna-Mandaru* secunda, quæ est secunda species *Mandaru*; est quoque arbor procera ut prima species densis frondibus latè sparsis, nascentisque in arenosis.

*Radix* crassa brachia in latum diffundens.

*Caudex* quoque crassus unum ferme pedem.

*Folia* quoque bifida ac interiora versus nonnihil clausa proximè similia prioris speciei foliis, sed iis ut & cæteris majora, suntque profundiori fissura incisa quàm illa primæ speciei, & anteriora versus lateribus paulò magis contractionibus, tactu lenia in adversa parte, ubi venulæ inter costas intermedia minùs exstant, colore magis hyalo, in recta viridi-fusciori.

*Flores*, qui unifolio viridi-flavescente & rubescente, crassio, plicato & segmentis in inferiori parte fenestrato succinguntur, quinque etiam vel sex constant foliis oblongo-angustioribus, quæ unguiculis longiusculis & angustis sunt, colore purpureo-valde rubicundo, quatuor autem vel quinque, tota superficie tam exteriori, quàm interiori purpureo-rubicunda, unum ad petiolum intus & extra striis albis venulas inter purpureas depictum ac variegatum est.

*Stamina* quæ folium variegatum cum suis apicibus viridi-dilutis ac flavescentibus inflexa respiciunt, tria, quatuor, vel quinque sunt ac crassiora, ac ad exortum sex septemve plurimis parvis filamentis comitata, colore purpureo-valde diluto seu albicante. Inter stamina *Siliqua* germen petiolo suo se prodit.

*Gemma Florum* quinquangulatæ.

*Siliqua* hujus omnium specierum maximè longæ sesqui-spithamam aut etiam duas æquantes, latitudine pollicari, planæ quoque compressæ, rectæ & glabræ.

*Faba*, quæ cum sua longitudine in latitudine filiquarum confitæ, eadem cum fabis prioris speciei forma & colore.

D d

Flores

*Flores* hæc arbor fert toto anno, tempore pluvioso uberiore proventu.

*VIRESEJUS.*

**R**adix masticata confert in dentium & capitis doloribus trita & apposita pro dolore arthritico, cum gingibere sicco trita & in unctione adhibita pro raucedine ex pituita oborta, in decocto data. *Foliorum* decoctorum vapor dolores corporis sedat in parte affecta exceptus. *Flores* simpliciter comesti purgativi sunt. *Cortex*, *Flores* & *Fructus* simul triti & mixti cum aqua in qua macerata fuit oryza, serviunt apostematis aperjendis & maturandis.

FIG. 33.


Denominanda videtur hæc species, | *has infide, flos interius purpurascens*  
Arbor filiquosa Malabarica, foliis majori- | striatis.







*Velutia-mandaru. lar.*  
 വെട്ടു കക്കാര mal  
 كحلجہ طما مازنی Arab.  
 دوا می دان Iran.





## VELUTTA-MANDARU.

FIG. 34.



*Velutta-Mandaru*, quæ tertia species est *Mandaru*, Fig. 34.  
lingua Bramanum, *Davò-Mandaru*, est arbuscula  
altitudine unius hominis, nascens in arenosis.

*Radix* minùs crassa nec profundè in terram de-  
scendens.

*Caudex* crassus unum circiter brachium.

*Folia* bifida quoque similia cum iis prioris speciei, sed lateribus  
oblongioribus ac profundius incisus sunt, & versus summiratem in  
cuspidem contractis, colore viridi-fusco in interiori, ac ad strias  
costularum nitentia, in parte autem exteriori colore viridi-flave-  
scente, ac in ea parte grossioribus extantibus nervis inter costas  
striata.

*Florès*, qui folio fenestrato viridi & tenui succinguntur, sunt albif-  
simi nullis tincti maculis, odoris nullius, constantes quoque quin-  
que foliis rotundiolis, parum oblongis, quæ venulis striata subtri-  
lioribus.

*Stamina* in iis decem candida è medio exeunt versus unam par-  
tem quoque inflexa, coloris albi cum apicibus flavis ac nonnihil  
surrectis in fastigiis, & cum iis tenerum germen siliquarum, è cu-  
jus vertice filamentum crassiusculum exit, se prodit.

*Gemma Florum* ob longo-rotundæ.

*Siliqua* minores cæteris, longitudine quatuor aut quinque polli-  
cum, latitudine quoque pollicari, planæ quoque ac compressæ &  
glabræ, nonnihil incurvæ versus unam partem, ac dorso rotundo  
latoque circumscriptæ.

*Faba*, quæ cum sua longitudine quoque in latitudine siliquarum  
constat ac intersepimentis distinctæ, oblongo-rotundæ, crassiolæ  
seu minùs compressæ iis *Chovanna-Mandaru*, ac multo minores co-  
loris flavi minùs rubescentis.

E c

Flores

*Flores* hæc arbor bis terve in anno fert tempore pluvioso, uberiori proventu.

## V I R E S E T U S.

**I**N aqua decocta facta lotionne pellit humores corporis; proficua quoque est pro ulceribus sanandis trita & iis apposita. *Radix* in oleo decocta facta perunctione pustulas parvas in auricula natas sanat. *Eadem* dentium dolorem sedat mansa & iis apposita. *Cortex* decoctus cutaneos corporis pruritus lotionne sedat. *Flores* cum pipere triti & fronti appositi conferunt pro dolore capitis.

## F I G. 34.

Hanc speciem non malè vocari posse | *Lauricem, foliis bifidis, flore candido*  
se crediderim. *Arborem filiquam Ma-* | *stratæ.*










*Cantharia pua* Lac.  
 തി. ഉ. ന. പ. *mal.*  
 جَاغِيَا جُو *Arab*  
 കാവണ് *bram*





## CANSCHENA-POU.

FIG. 35.



*Anschena-Pou* est quarta species *Mandâru* vocata, FIG. 35. lingua Bram. *Cantsanu*, est quoque arbor altitudine duorum ferme hominum, ramos quoque densos transversim diffundens.

*Radix* intus est corculo flavo.

*Caudex* est crassitie ferme semipedis.

*Folia* hæc bifida & illis priorum specierum similia, sed multò minora, lateribus versus anteriora, ut illa primæ speciei rotundiolis, ac ad petiolum rectionibus oris, nullo ferme angulo in curvatis, in utraque superficie valde lenia & pilosa lanugine, odore sunt forti, maximè cum teruntur, vespertino ac nocturno tempore interiora versus clausa sunt.

*Flores*, qui unifolio viridi-succinguntur, albo-flavescentes quinque foliorum, quæ oblongo-rotundiora & latiora ac unguiculis mutuo convoluta sunt; unum è foliis quod magis surrectum est & angustius ac oris versus interiora contractis ad unguiculum insignitum est pictura purpureo-rubicundo-obscuri coloris, quæ folium parvum in summitate acuminatum repræsentat. Odor eis nullus.

*Stamina*, quæ quoque decem habent, albo-flavescentia incurvatum versus folium, quod magis surrectum est ac pictura insignitum, ornata apicibus oblongis & flavis. In medio quoque germen siliquæ ex summitate filamentum crassiusculum ejiciens se prodit.

*Siliqua* sunt longitudine ut illæ primæ speciei, ac exteriori superficie valdè lenes & lanuginosæ, cum teneriores sunt.

*Faba* valde parvæ loculis satis latis, quæ intersepimentis interstinguuntur, contentæ, cum sua longitudine quoque jacentes in latitudine siliquarum, similes fabis *Velutta-Mandâru* forma & colore.

*Flores* bis terve hæc arbor in anno fert tempore pluvioso uberiore proventu.

Ff

VI.

## VIRESEJUS.

**R** *Adix* servit pro parotidibus aut strumis trita & iis apposita. *Radix Cortex* decoctus & eporus proficiuus est pro phlegmate, ventris vermibus, hepatis inflammatione, uti & pro hæmorrhoidibus. *Idem Cortex* tritus & parotidibus appositus tumorem tollit, ac eod. modo usurparus confert in vulnere sanatione & carnem adducit.

## FIG. 35.

Hæc non inæpè nuncupari poterit, *Arbor singula Malabarica, foliis* *lipsis minoribus, flore albo stercoratis* *privatis.*











Marotte  
 ॐ नमो भगवते  
 'ॐ' मारुत  
 करु व्रत





## M A R O T T I.

FIG. 36.



*Arótti* lingua Bram. *Caitu*, est arbor procera, ramis densis & opacis latè transversum diffusis, nascens in arenosis. Fig. 36.

*Radix* crassa, ramos latè spargens, exterius valde nigricans, intus cortice rubescente, qui saporis est adstringentis, ligno albicante.

*Caudex* crassus, ambitu unius hominis amplexum implens, ligno albicante, cortice crasso, qui exterius ex viridi nigricans, sub exteriori crusta rubescens.

*Rami* cinerei, teneriores, villosi ac spadicei seu muscosi coloris.

*Folia* hinc inde in ramis, furculisque petiolis brevibus, viridibus, rotundis proveniunt; suntque spithamam longa, quatuor quinqueve pollices lata, forma oblongo-rotunda, anteriori cuspide oblongo-angusta eminentia, in margine crenata ac denticulis acutis emicantia, contextura solida, crassa, superficie plana, in recta parte viridis fusci, in adversa viridis communis vel clari, in utraque nitentis, maximè in adversa, suntque odoris sylvestris, nonnihil gravis.

Ex costa media quæ in recta parte nonnihil eminet, *Costæ* transversæ in adversa maximè eminentes, tenuiter verò in recta, obliquo annulari ductu exeunt juxta marginem tractu longiusculo excurrentes ac in arcus sinuati, venulisque subtilibus transversis, quæ & in superficie utrinque conspicuæ sunt, intertextæ.

*Flores* in superiori parte ramorum hinc inde tum supra ex origine foliorum, tum ex ipso corpore septem octove plus minus ad unum exortum congregatum penolis curtis proveniunt, suntque gemmæ parvæ, quæ apertæ tres series foliorum offerunt; in prima interiori serie est stella quinque minorum crassorum cuspidatorum foliorum, quæ villosa sunt & spadiceo-fusca, lenia ac nitentia instar *Veluti*; in secunda serie quinque folia sunt majora, rotunda, parva, interiori cochleato-cava, subrufa ac pilis candidis maximè in oris obducta, quæ singula unum cuspidatum folium stellæ intra se recipiunt: quæ in tertia seu exteriori serie sunt folia quinque cuspidata, viridia, exterius viridi-muscosa, quæ cum in gemmis sunt flores exteriora folia sunt reliqua includentia; ex umbilico

*Stamina* quinque inferius crassiola, viridia & pilosa, superne tenuia & albicantia cum apicibus rotundiolis albicantibus subflavis emicant in se globulum viridem, qui est rudimentum fructus complectentia.

Gg

Gemma

*Gemma Florum* rotundæ & nonnihil viridi-muscofæ.

*Fructus*, qui ramis petiolis curtis, crassis, ipsis ramis ferme duplo crassioribus appendent, ac pandi sunt, rotundi seu etiam oblongo rotundi, in summitate sæpe curto seu oblongo nodo eminentes, cortice exterius rufo ac muscoso & scabro, intus viridi, qui in se includit os pergrande, durum, crassum & subflavum, quod intus alba, crassiola & duriola carne obductum est, & in medio capacitate satis grandi nucleis decem, undecim, plus, minus sine intersepimentis intermediis repletum; suntque nuclei primum cortice crassiole, molli, albicantes & flaviusculis pilis obsiti, forma irregulares & angulosi, intus repleti medulla alba, quæ primum liquida est & mucilaginosa, dein cum planè maturi, obtecti sunt nucamento osseo scabro, suntque tum forma oblongo-angustorotundi & cuspidati, intus oleosi.

*Fructus* ac præsertim *Nuclei* gravis & sylvestris odoris sunt, qui in foliis est debilior.

*Flores* hæc arbor toto anno uberi proventu fert, ut & *Fructus* copiosos.

#### V I R E S E J U S.

**O**leum quod ex *Seminibus Fructuum* educitur, proficuum est pro doloribus sedandis, sanatque corpus scabiosum ac partis affectæ pruritus tollit facta perunctione. *Idem Oleum* quoque oculis salis humoribus infestatis, uti sæpe fit in profusis lacrymis, conferunt; insuper *Idem Oleum* cum cinere mixtum commodè apponitur vaccarum cæterorumque jumentorum apostematis; cum fructu dicto à Malabaribus *Palega*, mixtum, vermes in ulceribus pedum hominum seu brutorum ortos enecat facta perunctione.

#### F I G. 36.

Hæc quoque cum sit ex illis arboribus, quarum nulla sit, quod sciam, apud reliquos auctores mentio, nominari poterit *Laurifolia Malabarica*, *fructu oleoso*, *nucleis emacatis*.

An autem in aliis quoque Indis regionibus nascatur, asserere nequeo, præsertim cum inter plantarum meas siccitas *Larancusa*, *Ceylonensa*, aliisque, non reperitur.





*Pisairam* lat.  
 കായ. Mal.  
 فاعقرا Arab.  
 काये bram.







## C A N I R A M.

FIG. 37.



*Aniram* quatuor species, una ejus nominis, secundum *Fig. 37.*  
da *Cára-Caniram*, duo *Vall-Caniram*.

*Caniram*, ling. Bramanum *Carò*, est arbor proce-  
ra, ramis densis latè sparsis, nascens in arenosis.

*Radix* crassa, supra modum amara & cortice fla-  
vescente.

*Caudex* ambitu amplexum duorum hominum implens, cortice  
cinereo-nigricante.

*Rami* cinerei hinc inde rubescentes ac detrita exteriori crusta fla-  
vescentes, furculi teneriores viridi-fusci, nodosi cortice amaro.

*Folia* in furculis bina & bina ex nodis proveniunt se mutuo in or-  
dine obliquè decussantia, suntque oblongo-rotunda latitudine maxi-  
ma in medio, antèrùs rotundo-cuspidata, superficie plana, virore  
communi in recta nonnihil nitente, in adversa surdo, saporis valde  
amari, odoris planè agrestis.

Cum costa media ex qua hinc inde nervi tenues, transversi ac  
minus obliquè excurrunt ex petiolo *Costula* utrinque duæ exeunt, in  
recta etiam parte nonnihil eminentes, ac obliquo arcuato ductu an-  
teriora versus excurrunt marginem folii relinquentes, & quidem quæ  
costæ mediæ proximæ, sunt altè affurgunt, suntque folia in recta  
parte nervulis eminentibus cancellatim contextis striata; in adversa  
autem venulis seu tenuissimis nervulis in densiores cancellos con-  
textis dotata.

*Folia* jam tum per intervalla deciduis in illis notis, ac vestigiis quæ  
relinquunt, nulla nova folia redeunt, *foliaque nova & tenella* tantum  
ex summitate furculorum succrescentium prorumpunt.

*Flores* in furculis ex nodis umbellatim proveniunt, suntque parvi,  
quatuor, quinque vel etiam sex foliorum viridi-dilutorum, cuspidato-  
rum & crassiorum cum pedunculo crasso, parvo, viridi, calyci ar-  
cto quinque foliorum cuspidatorum insidentes, forma externa haud  
dissimiles caryophyllis, odoris debilis haud injucundi.

*Stamina* in iis quatuor vel quinque cum apicibus oblongis viridi-  
dilutis ex pede emicant, suntque pedi interiùs inserti; inter ea sty-  
lus viridi-dilutus, supra apices emicans, qui è globulo viridi in ca-  
lyce sito prodit.

*Flores* cum in gemmis promicant omnibus foliis vetustis arbor est  
foliata, ac cum *Gemmis Florum* simul *Tenella Foliola* velut nova ger-  
mina prorumpere conspiciuntur.

H h

Fru-

*Fructus*, qui solitarii, vel etiam duo, tres, quatuor pluresve congregatim fuculis petiolis curtis appendent, rotunda mala sunt glabra absque rugis colore primum viridi, dein atro-flavo, carne, cum immaturi sunt, albicante & parum aquosa; cum maturi, candida & mucilaginosi, cortice crassiusculo & fragili, suntque *Saporis* valde amari.

*Semina*, quæ intra carnem fructus confita sunt, forma rotundiola, plana ac compressa, cum planis suis superficiebus jacentia in longitudine fructus, cortice, cum immatura sunt, argenteo parum ad spadiceum vergente, maturi cortice exteriori instar *Veluti* viridis; suntque pulpa valde amara.

Tota arbor ob *Amaritudinem* celebris.

*Flores* fert tempore æstivo, pluvioso *Fructus*.

#### V I R E S E J U S.

**R** *Adix* decocta & epota purgativa est, humores per inferiora evacuant, quomodo etiam prodebant pro febribus pituitosis, doloribus colicis, intestinorum torminibus, ventris fluxibus eandem quoque vires habet, si in infusione detur, vel si ejus decoctum cum momento piperis sumatur; conducit in podagra, si cum ejus decocto pars affecta ungatur, confertque sedandæ vertigini capitis, atque etiam in atra bili, si ejus decoctum cum lacte vaccæ mixtum ad delibutionem capitis adhibeatur. *Cortex* contritus & mixtus cum aqua, in qua fuit oryza, flavæ bilis fluxum reprimat. *Folia* decocta rheuma seu catarrhos sistunt, facta lotionem corporis. *Succus* ex *Foliis* expressus ac in decocto datus capitis dolores sedat, largius epolus veneni vires habet mortem inducens, in stercore hominis comesto salus est. *Flores* sedant dolores unguium, si triti ac in oleo *Coqui Indici* cocti iis apponantur.

Ufus *Seminum* in *Fructibus* per duos annos continuatus, sumpto singulis diebus uno aut duobus numero, efficit ut morsus venenatus colubri, vulgò *Cobra Capella* dicti, nullas noxas adferat.

#### F I G. 37.

*Mala Malabarica folio & fructu americana, semine plano compresso*, commodè hæc ab aliis non descripta arbor, vocari possit.


Coluber autem ille venenatus, sive *Cobra Capella* Lulianorum, cujus morsus semina hujus mali sanare, referunt Auctores, frequentissimus est in Insula *Zelan*, & præ aliis venenatus, vocaturque ibi-

dem *Naja* & *Naghaia*: obtinetque illud particulare, quod in posteriori colli parte, conspiciendi figuram gerat, distinctis coloribus expressum: uti quoque in ipsius exuvii, in Porcu Horti Academici suspensum, videre licet. Quas anno præterito, munere Domini *Hermann*, cum aliis rarioribus accepimus.





*Nelicamaram*. lat.  
 നെലിക്‌നാമര. mal.  
 حَمْلَمَرْ قَامَرْكُ Arab.  
 അമ്പി bram





## NILICAMARAM.

FIG. 38.



*Nilicamarâm*, lingua Bram. *Arroali*, est arbor altitudine quatuor hominum, ramis densis transversum diffusis, nascens in arenosis & petrosis. Fig. 38.

*Radix* crassa est, plurimis capillatis fibris se terre affirmans cortice nigricante, quæ sub crusta nigricante intus nonnihil rubescit.

*Caudex* amplexum unius brachii ambitu implens, cortice nigricante ut & rami.

*Folia*, quæ in furculis tenuibus, rotundis ac spithamam & paulo amplius longis, qui hinc inde è ramis vel solitarii, vel bini, terni, vel quaterni ex eodem nodulo exoriuntur, brevissimis petiolis proveniunt, in duabus seriebus transversim & paulo oblique anteriora versus reclinata, & cum planitie suarum superficiarum furculos medios secantia, suntque parva, oblonga & angusta, latitudinis ubivis uniformis, plana, tenuia, solida seu densæ texturæ, una tantum venula in medio striata, in recta parte virore fusco, in adversa claro-diluto, suntque tempore vespertino seu nocturno, quæ in eadem serie sunt clausa ac ad se mutuo decumbentia, ad pedunculos autem singulorum foliorum cauliculi punctis cuspidibusque utrinque è latere emicant, quo ipso maxime cum foliis nudati sunt, scabri & asperi apparent.

*Flores* qui cauliculis foliaceis, maxime in eorum inferiori parte, ut & ramis, ex quibus cauliculi foliacei prodeunt, plures congregatim insident, parvi sex foliorum angustorum albicantium, habentes in medio stamen albicans cum nodulo seu apice flavo, qui postmodum obscure rufescit, odoris nullius.

*Gemma* *Florum* rotundæ & albicantes.

*Fructus*, qui floribus deciduis, ramis & furculis arcte insident, sunt plano-rotundi, duri viridi-diluti, etiam cum maturi sunt ac nonnihil transparentes, sex subtilibus venulis quæ in verticem concurrunt, in longum striati, carne succi plena, transparente ac viridi-diluta, quæ saporis est acidi, delectabilis & subadstringentis, suntque in eduliis; suntque furculi foliacei, quibus fructus insident, parte inferiori foliis nudati.

In medio fructuum *Officulum* est durum, lignosum filamentis oblitum, sex lateribus rotundiolis, quorum tria opposita magis prominent, constans, ac per sex intermedia interstitia, quæ angulis

adstricta sunt, in sex capsulas, in quibus singulis unum semen continetur, distinctum, sunt autem

*Semina* parva, triangularia, duobus lateribus rectis & uno rotundo circumscripta, primum albicantia, dein coloris rubri-obscuri ac nitentis.

VIRES EJUS.

**D**ecocta in aqua servit pro morbis endemiis. *Folia* ejus tenera & in lacte acido epota conferunt fluxui dysenterico. *Fructus* exficcati & in pulvere cum lacte acido spisso dicto *Tayr* dati quoque in dysenteria profunt. *Idem* in decocto dati proficui sunt pro febre calida, uti & pro ardore pectoris, cum saccharo decocti & epoti vertiginem capitis sedant. *Aqua*, quæ ex *Fructibus* distillatur, epota ardori jecoris restinguendo convenit.

FIG. 38.

Arborem hanc denominare placuit, *Acacia foliis Malabaricam*, *fructu rotundo*, *semine triangulo*. Imò planè non vereretur ad *Acaciam* referre, ni fructus obliaret, qui nullam cum ipsa affinitatem obinet. Proveniunt autem cum in aliis Indiæ regionibus, tum præsertim in Insula *Zelon*, variet *Acacia* species, Europæi hæcenus incognitæ. Præter enim legitimam sive *Ægyptiacam*, quæ foliis *Scepioidis Leguminosæ* C. *Babine* dicitur: Alteram *stereopachitima* Cat. *Paris.* quæ *Americana* dici consuevit, & *Fernandam altam* ; frequens ibidem nascitur *Alana* genus, strobilos ferens luteos racematos

cohzrentes, siliquis majoribus latis, planis, *VTaurinæ* & *Congalensis* dictum, à *VTaurinæ* id est, vespertilioe, quod ejus spinulæ similes sint unguiculis vespertilionum, quibus tanquam hamulis, arborum ramis, in Indiâ observantur affixæ. Huic quoque floribus non dissimilis, siliquis oblongis minoribus, quibus semina majora exterius insigniter protuberantia conspiciuntur, in sylvis pallam crescit, vocaturque *Congalensis Cathakarakæ*, à gratè acido foliorum sapore. Prætereaque *Acacia* foliis nonnullæ aliæ observantur, inter quas hæc ab Autoribus descripta, etiam numeranda venit.










*Ocullum. Lat.*

ॐ ३ ७. *mal*

عُضْوَةُ الْاِمْ *Arab.*

कुसुम *bra.*





## O D A L L A M.

FIG. 39.



*Dallam*, lingua Bramanum *Urò*, est arbor altitudine duùm triumve hominum, nascentque in arenosis. Fig. 39.

*Radix* fibras capillatas in latum subtus terram emitens, cortice alicante subdulci & subamaro.

*Candex* crassus, unius hominis amplexum ambitu implens ramosque tortuosos diffundens, ligno mollissimo cum corculo intus rufo, cortice lacteo-cinereo-fusco, qui amarus & mordax est; in furculis teneris cortex exterior viridi-fuscus, ac lignum ex filamentis minus tenacibus constans: corculum intus viride & humidum.

*Folia*, quæ hinc inde in ramis & furculis petiolis crassis, in interiori parte planis ac viridi-dilutis & lacteis proveniunt, angusto-oblonga sunt, ac linguiformia ad petiolum stricta, anteriora versus latiora, ac in cuspidem brevem & angustam, quæ versus adversam partem nonnihil reflectitur, contracta: suntque textura crassa, solida, lactea, mollia, superficie lenia, glabra & nitentia maximè in parte recta, ubi viroris sunt fusci, sapore amaro & pungente.

E costa media, quæ crassa est & viridi-diluta & albicans, & in adversa tantum eminet, *Nervi* valde subtiles intra folium & parum in adversa extuberantes transverso ac parallelo ductu exeunt *Venulis* subtilissimis intertexti.

*Flores*, qui umbellatim proveniunt in petiolis longis, crassis, languidis, lacteis, viridibus, qui supra ex summitate caulis crumpunt, sunt quinque foliorum albidissimorum, cuspidatorum, quæ inferiora versus contractiora sunt, cum uno latere latius excurrentia, atque in parte, ubi minùs excurrunt & rectiori ora sunt, crassiora, & in unguiculis colore flavo seu croceo, insidentque cum pede crassiole viridi diluto calyci, qui quinque foliis oblongo-angustis, cuspidatis, crassiolis, interius albicantibus, exterius viridi-dilutis constat; ex medio florum emicant *Stamuncula* tenuia, quinque, quæ crassiolis, flavis, striatis ac surrectis apicibus juxta unguiculos foliorum dotata sunt, ac pedi interius inserta, & cum iis stylus tenuis, liber, albicans cum nodulo crasso ac pyriformi in vertice ex primordio fructus qui infra calycem est, prodiens; floribus cum suis pedunculis è calyce decisis succedunt.

*Fructus*, qui petiolis crassiolis, longiusculis, languidis ac pandis appendent, suntque mala grandia oblongo-rotunda & nonnihil

K k

plana,

plana, ac in parte ubi magis compressa, tenui sulco in longum striata, pondere valde levia, cum parvula, ac teneræ ætatis, oblongo-angusta; constantia cortice exteriori tenui, glabro, lacteo & viridi-flavescente; ad corticem intus pulpa tenui, albicante & lactea, quæ saporis est aquei.

In medio os est grande, referens nonnihil exemplar cordis humani, constans nucamento duro ac ossæo, quod exterius sub pulpa mali lato interstitio filamentis lignosis & albis reticulatim pertextum ac inter cancellos fungosa albicante pulpa stipatum est ac pulpa corticis circumdatum, includitque nucleos duos albos, candidos, qui intersepimento crasso, duro & cartilaginoso extruberante ac nucamento ossæo affixo, à se mutuo sejuncti sunt, suntque nuclei forma oblongo-rotundioli cum sua longitudine siti in longitudine corculi; una parte, qua intersepimento adjacent, plano, altera rotundo & parum convexo latere, ac majori crassitie ad basim ossæi nucamenti, saporis amari, in teneris autem nucleis pulpa sub cortice candido est instar albuminis ovi, seu mucilaginis claræ ac pellucidæ, quæ etiam subamara est.

*Apud hosce Medicos non est in usu.*

F I G. 39.

Hanc arborem, *Manga* vulgo dictæ arboris, esse speciem, siquis pronunciaverit, à vero non aberraturum crediderim. Verum cum Botanologi plures recenseant, easque vix nisi nominibus describant, vix videtur assignari posse, ad quam detrum hæc referri debeat vel possit. Interim nobis erit *Persea* similis angustifolia, esse credis humani figura, hinc nucleos continere.

Transmisit quoque jam sæpius laudatus Domi-

nus Hermann; hoc anno, ex Zeilen, ad Excellentissimum & Illustrissimum Dominum de Berenberg quorumvis scientiarum, & imprimis Botanices Patronum & Mæcenatem summum, illud *Manga* genus, quod ab *Acacia Manga Travi*, & fructu venenato à C. Bauhino dicitur, verum molestiarum itineris, & cæli frigidioris impatiens, ferè exaruerat, antequam ad hæc oras appulisset.







Maslanghan lar  
 சகிலா வி மட.  
 مَسْلَاحَنُ Arab.  
 மசுலாஹ் Gram





## MAIL-ANSCHI.

FIG. 40.



*Mail-Anschi* est arbor altitudine trium hominum, ramis densis & opacis latè sparsis, nascens in arenosis, dicta lingua Bram. *Mety*.

*Radix* crassa & profundè se demittens, fibras hinc inde dimittens cortice cinereo seu albicante, qui sub exteriori cuticula rubescit, intus albicans est.

*Stipes* ambitu paulo minus amplexum unius hominis implens, estque cum ramis cortice cinereo, ligno duro & albicante, intus cortex ramorum minùs vetustiorum sub cinerea corticula viridescit.

*Folia* furculis tenuibus, brevibus, qui etiam bini, terni, quaterni congregatim ramis crassioribus erumpunt, bina & bina vel solitaria proveniunt, iique brevissimis pedunculis insident, suntque parva, oblongo-rotunda & angusta, anteriùs cuspidata, seu etiam rotundiola, ad petiolum striata, contextura tenuia, superficie plana & glabra, viroris communis & nonnihil nitentis, saporis subamaro.

Ex costa media *Costula* etiam in recta nonnihil eminentes, quæ arcuatim in se invicem incurrunt, exeunt venis nullis conspicuis intertextæ, sapore subamaro & odore nullo.

*Flores* proveniunt in summitate furculorum foliaceorum in parvis, tenuibus, rubris petiolis plures congregatim ac racematim, sunt autem parvi, odoris haud injucundi, hortensis, quatuor foliorum ex albicante subflavorum, crispatorum, latiusculo intervallo à se invicem distantium, quæ postea magis flavescent.

*Stamina* in iis octo albicantia apicibus grandiusculis & subflavis dotata, quæ bina & bina ex foliorum intervallis emicant, in medio se prodit globulus viridi-dilutus & rotundus, qui primordium est fructus cum stylo albicante in vertice.

*Calyx* quatuor foliorum cuspidatorum & viridium.

Floribus deciduis succedunt in racemis *Bacca* rotundæ cum spi-

culo in vertice ac calyce suo inferiùs atq̃tè contentæ, seminibus numeroſis tepletæ, & carne intra ſemina, ſaporis adſtingentis, primùm virides, dein ruſcentes, poſt nigricantes.

*Semina* ſunt oblonga, cuſpidata, angulata cum baſi rotunda ad corticem ſita, ac alia in parte ſuperiori, alia inferiori baccarum cum ſtrictiori parte ſeu cuſpide interiota baccarum reſpicientia, primùm ſubflava, natura ſuſca ac nigricantia.

*Flores* fert ſemel tempore pluvioſo.

#### V I R E S E J U S.

**R** *Adix* in decocto data conducit in doloribus pedum ex podagra natis. *Folia* in decocto cum ſaccharo data, ſeu ſimpliciter & in lacte epota conferunt pro ictero. *Succus* ex *Foliis* expreſſus & in lacte vaccæ cum ſaccharo epotus, urinantibus materiam albam & purulentam prodeſt.

#### F I G. 40.

Lubuit hanc plantam appellare *Oxyantha* eff. | offes, vel molliuſcula & membranaceæ & Aurores  
non addunt) & ad *Rhamnus* ſpeciem reſerre malit,  
cui tamen obſeſt ſemina, (quæ an dura ſint & nec cum eo linigabo.








*Cumbulu. lat.*

കുമ്പളി *mal.*

قثامحور *Arab.*

वायजो *bra.*







## C U M B U L U.

FIG. 41.



*Umbellu* ling. Bramanum *Bòn-Varò*, est arbor pro- Fig. 41.  
cera ramis ex medio caudice in altum, minùs verò  
in latum diffusis, nascens in arenosis.

*Radix* albicante & crasso ac molli cortice, qui  
subamarus est, ligno albicante, fibras longas emit-  
tens.

*Caudex* ambitu amplexum unius hominis excedens, vestitus cor-  
tice crassiole & molli, qui exterius crustâ albicante obductus est  
& sub ea nonnihil viridis, intus albicans odorem calcis æmulum  
fundens.

*Rami* & furculi cinerei ac nodulis hinc inde interstincti, tenerio-  
res virides.

*Folia*, quæ longis, rotundis, crassiolis, languidis, viridibus petio-  
lis bina & bina in nodulis proveniunt ac se mutuo ordine decussant,  
oblonga sunt, in longitudine unam spithamam & duos tresve pol-  
lices, in latitudine duos palmos æquantia, ad petiolum maximâ la-  
titudine, cum minora sunt formæ rotundioris & minùs oblongæ,  
anteriora versus sensim contracta & in cuspidem oblongam definen-  
tia, suntque tomentosa lanugine obsita, maximè in adversa & le-  
nia, viroris in recta valde fusci & parum nitentis, in adversa clari ac  
diluti, odoris nullius nisi sylvestris, saporis amari.

Ex costa media, quæ *Costa* excurrunt in adversa parte altè & solum  
eminent, ac à margine reflexæ arcuatis ductibus multiplicibus, quibus  
minores arcus versus marginem superinducti sunt, in se invicem  
deferuntur; prope ad petiolum quoque utrinque ex costa media  
costa exit ramos quatuor, quinqueve majores versus marginem di-  
mittens, ac arcuatim in se invicem conducens, suntque inter costas  
tractibus suis rectam folii partem striantes ac nervis numerosis trans-  
versis intercurrentibus, & solum in adversa parte eminentibus, qui  
tractibus suis rectam quoque partem striant, comitatæ.

*Flores* in summitate furculorum plures congregatim brevissimis pe-  
dunculis pandi proveniunt, suntque flavi forma instar cucullorum,  
lacinii seu foliis quinque rotundiolis, crassiolis, quorum unum ma-  
juscule est & latius ac cæteris longius propendens, quatuor reli-  
qua versus exteriora reflexa sunt incisi, supemè ad folia seu lacinias  
latiores quàm parte inferiori, ad calycem atque ad partem folii la-  
tioris & longioris magis protensi & convexioris, coloris interioris

M m

flavo-

## H O R T U S

flavo-clari, exterius ubi tenuiter pilosi sunt, flavo-fusci, odore non-nihil debili & non injucundo.

*Stamina* in iis quatuor flavo-albicantia ac nonnihil inflexa versus folium majus, quæ dotata sunt apicibus grandiusculis, flaviusculis ac inferiori cuculli parti interius inserta sunt, duo præ cæteris emicant; inter ea stylus flavo-albicans superius bifurcatus conspicitur, qui ex viridi-capitulo, quod in calyce residet ac fundamentum fructus est, excurrit.

*Calyx* brevibus in oris est cuspidibus arcuè flores includens.

*Gemma Florum* viridi-subflava, oblongæ, foliis superne in quinque angulos complicatæ.

*Fructus*, qui calyce florum primùm in totum & arcuè excepti sunt ac brevibus pedunculis appendent, oblongo-rotundi, parte superiori crassiores, hinc inde tuberculis exturgentes, carne intus succulenta, flava, subdulci & amara, cujus humor expressus unctuosus redditur flavo intenso ac rubescente colore manum tingens, cortice crasso, primùm virides, dein flavo-diluti, odoris quoque debilis, non injucundi.

In medio continetur unum ossiculum albicans, oblongum, durum, glabrum, pyriforme, æ acutis tuberculis hinc inde eminens, parum nuclei in se continens.

Bis in anno fert flores.

### V I R E S E J U S.

**R***Adix* in decocto data addito pauxillo oryzæ prodest in febre symptomatica, comitante podagram seu dolorem arthriticum. *Eadem* data in lacte acido vel in Oleo *Sirchelium* proficua est pro flatibus & dolore thoracis. *Radicis Cortex* contritus & in aqua decoctus juvat in febre frigida, idem contritus & per tostionem in pulverem redactus servit in podagra facta perunctione partis affectæ. In lacte acido datus intestinorum sedat tormina, ad quod etiam confert succus foliorum epotus.

### F I G. 41.

Arbori hinc descriptæ nihil est quod | *Morem Malabaricum* intusum, flos cunct-  
addam nisi quod appellandum censuem | *lax.*

CAN.






Cassia. lat.

காசி மல.

كاسية Arab.

காசி beam











*Pilega-pajaneli. lar.*

பலகிபயாத்தில mal.

يُولَانِيَا يَاعْنَحِيْلِي Arab

ரவகி bran





## PALEGA-PAJANELI.

FIG. 44.



*Ajáneli* duæ species sunt, *Pálega-Pajáneli*, <sup>Fig. 44.</sup> & *Pajáneli*.

*Pálega-Pajáneli* ling. Bram. *Davandicu*, est arbor procera nascens in arenosis, ramis minùs in transversum diffusis.

*Radix* fibrosa ramos quaquaversum emittens cortice crasso, molli, qui exterius est rufus, intus ex viridi flavescentis coloris, saporis subamari, ligno albicante & molli, qui facilè in filamenta protrahitur.

*Caudex* ambitu unius hominis amplexum implens, cortice cinereo, & rami qui sub cinerea crusta virides sunt, teneriores virides, scabri seu ob punctula asperi, grandibus nodis, ex quibus ramos transversos binos & binos ejiciunt, extuberantes, suntque intus corculo fungoso & albicante, ligno pauco ad corticem, atque adeo valde leves: cum vetustiores sunt, decidunt, notas relinquentes, in quibus etiam novi erumpunt.

*Folia* in furculis longis interiùs lira striatis, qui ex caudice ipso vel etiam ejus ramis crassis in quos diffusus est, produnt, simplices ac in nullòs ramulos divisi ac quinque sexve cubitis plus minùs longi sunt, petiolis curtis ac interiùs striatis bina & bina & numero terna; quina, septena cum uno folio in extremitate proveniunt, suntque forma cordis humani, ad petiolum rotunda ora, anteriùs cuspidè angusta eminentia, contextura tenuia & mollia, superficie lenia, viroris in recta parte fusci, in adversa clari, sapore subamaro & sylvest. & odore.

Ex costa media *Costæ* in adversa solum parte eminentes obliquo annulari ductu exeunt, ac à margine reflexæ in se invicem incurrunt, suntque comitatæ. *Nervulis* transversis in adversa solum parte eminentibus, ac *Venulis* cancelliformiter in se invicem ductis, quæ in adversa tantum conspicuæ intertextæ, odoris gravis.

*Flores* in apice ramorum proveniunt plures congregatim petiolis crassiusculis & viridibus, suntque grandes campa-

O o

ni-

niformes cum collo oblongo, & ad unam partem nonnihil inflexo, calyce oblongo-rotundo & profundo infidentes, constantque sex foliis crassiolis, quorum quatuor quæ ad concavam colli partem sunt exteriora versus maximè reflexa, duo quæ ex adverso surrecta & minùs inflexa: suntque folia fungosa nullis perducta venis conspicuis, in oris crispa & corrugata duabus pluribusve liris profundis exterius in longitudine striata; flores autem sunt coloris maximè interius albicantis seu ex albicante subflavi, exterius in colli convexa parte foliisque surrectis quæ versus eam partem sita sunt, striis rubescentibustincti, odore fetido.

*Stamina* in floribus quinque crassiola & nonnihil inflexa ex albicante subflava seu viridi-diluta, ac versus folia surrecta jacentia, ac in inferiori parte, quæ crassiora sunt, collo interius inserta seu annexa, geruntque apices incumbentes flavos, latos, ac ad unam partem in duas angustas lacinias contractos; cum staminibus emicat stylus tenuior & albicans, in summitate in planum extenuatus, qui ex plano albicante ac subflavo capitulo, quod rudimentum fructus est, & in fundo calycis situm erumpit.

*Calyx* crassiolus laxè collum floris excipiens in ora parùm cuspidatus ac ad concavam colli floris partem viridi-albicans, ad convexam rubro-obscurus.

*Gemmæ florum* oblongo-rotundæ primùm virides, dein cum se ex calyce magis produnt, apice rubro-obscuro.

*Fructus*, qui floribus deciduis succedunt, prægrandes sunt, formâ velut machæræ, tres spithamas longi, lati unum palmum, crassi unum ferme digitum cum oris ad unam partem nonnihil reflexis constantes cortice crassiole viridi, qui exterius viridi-fuscus est, ac dein magis infuscatur, interius primùm viridi-dilutus seu albicans, tenera ac humida carne, quæ dein in lignosam duritiem evadit, ac flavum colorem assumit obductus, suntque in cortice exterius in medio in longum in utraque parte uno sulco striati.

Interius in medio fructus latum *filamentum* est, juxta ejus latitudinem in planum extensum, quod primùm tenerum & albicans, dein cum siccum, quoque duriolum ac velut coriaceum est, estque tum velut lingua distinguens fructum in duo loculamenta, in quibus singulis semina innumera continentur.

*Semina*

*Semina* autem lato-rotunda & valde plana seu compressa cum umbilico longiusculo membranaceo albicante involucri amicta, & lata membrana pellucida albicante circumcincta, jacentque seriatim in planum in suis involucri, alia proximè ad unam, alia ad alteram oram; nudata suis involucri viridia sunt & densæ carnis, saporis nullius.

## VIRES EJUS.

**C**ortex arboris servit pro consolidandis fracturis & scissuris tritus & cum vino appositus. *Radix* in decocto data in hydropè prodest. *Eadem* cum oleo decocta ad capitis corporisque malè affecti unctionem adhibetur. *Folia* tenella trita & unà cum *Croco Malabarico* ulceribus admota ad sanationem conferunt.

## F I G. 44.

Mirandum hanc arborem, *Crysinosifon* quoque esse; autem præter nomina à nostris Autoribus exhibita, alia indigenam, ejus filique inde ad me transmissæ tellantur; expiscari nondum licuerit, vocandam censeo. *Arborem* adhuc illæ quatuor uni pediculo, & tres ferme pedes *filiquosum Malabaricum, cordato folio, fructu mucoso* longitudine; latitudine autem, dimidium æquant. Cum *oblongo plano, semine membranaceo.*











*Pajaneli. lac.*

പൈനലി. *mal*

پائنجلی. *Arab*

दवडि. *bran.*





## P A 3 A N E L I.

FIG. 45.



*Ajāneli*, quæ est secunda species ling. Bram. Fig. 45.  
*Davandicu*, est arbor procera, ramos in altum,  
 minus verò in latum diffundens, nascens  
 in arenosis.

*Radix* latè sparsa, cortice crasso, aqueo,  
 cinereo-nigricante, intus albicante, sapo-  
 ris subamari, in ramos sparsi, ex quibus hinc inde novi  
 stirpes circa medium caudicem expullulant, ligno albican-  
 te & minus densè contexto, quod in filamenta facile pro-  
 trahitur.

*Caudex* ambitu amplexum unius hominis adimplens, li-  
 gno quoque fragili & in filamenta se findente, cortice quo-  
 que cinereo-fusco.

*Surculi* qui foliis vestiti sunt è caudice egrediuntur, sunt-  
 que simplices in nullos furculos divisi, quinque, sexve am-  
 bitus plus minùs longi, viridi-diluti & nonnihil scabri seu  
 punctulis asperi, rotundioli ac in una parte, quæ cum interi-  
 ori foliorum convenit, angulo acuto eminentes, nullis ex-  
 tuberantes nodulis, ut illi primæ speciei, intus etiam fun-  
 gosi & albicantes, ligno pauco ad corticem, atque adeo val-  
 de leves: furculi novi è summitate caudicis tantum erum-  
 punt, inferioribus vetustis deciduis, ac notas relinquenti-  
 bus.

*Folia*, quæ in iis ramis passim bina & bina, seu nonnihil  
 à se invicem distita petiolis curtis, languidis, interius  
 striatis, proximè ad angulum, quo eminent, transversa  
 proveniunt, multo majora sunt illis primæ speciei, lon-  
 gitudine spithamæ & amplius, forma oblonga, laterum  
 difformium, quorum illud, quod caulium fastigium respi-  
 cit, duplo ferme amplius & rotundioris oræ reliquo, ac ex  
 inferiori parte petioli egrediens, antè in cuspidem an-  
 gustam contracta, in recta parte viridi-fusca, in adversa cla-  
 ra, novella autem rubra seu hepatici coloris, odoris male-  
 olentis, texturæ grossioris.

*Costulae*, quæ ex media costa in adversa obliquo arcuato du-

P p

ctu

Et excurrunt à margine reflexæ multiplicibus arcubus in se invicem incurrunt, ramulos transversos, qui in adversa solum extant, ac venulis intertexti sunt, ex se distribuentes; suntque folia in costarum nervorumque tractu in recta parte striata.

*Flores* quoque campaniformes ac similes illis primæ speciei, verum hi quinque foliis incisi sunt, quorum tria ad concavam colli partem exteriora versus maximè reflexa, duo quæ minus incisa, surrecta & nonnihil reflexa sunt, ac folia multò crassiora, magis fungosa, ac in oris pilosa seu lanuginosa sunt.

*Stamina* in hisce floribus tantum quatuor, quæ bina & bina apicibus albicantibus, qui singuli instar duorum linearum ex summitate dependent, arcuatim à se mutuo inflexa sunt.

*Calyx* spisso ac mucoso lacte, quo etiam florum exterior superficies inuncta, intus obductus; suntque flores uti folia odoris maleolentis seu fœtidi.

*Fructus* plane iidem.

#### V I R E S E J U S.


**F** *Oliis* ejus pinis & tritis & unâ cum *Carécca*, id est *Mirabulano* Citrino maceratis in pirulis utuntur ad tingenda linimenta colore nigro, quæ in suis exequiis gerunt.

*Radix* trita & decocta in oleo pro capitis dolore servit facta perunctione, quo modo usurpata catarrhos & quoscunque humores pituitosos caput obfidentes educit. *Cortex* radices in decocto datus tumoribus resolvendis commodus est. Decoctum ex *Cortice* & *Foliis* simul tritis in unctione corporis pro pustulis ac ulceribus servit.

#### F I G. 45.

Cum hac arbor à præcedente non nisi foliorum figura, & sita, & quadamenus flore differat, fructu autem & semine conveniat, hinc nobis erit *Arbor filiquia*. *Malabarica, folio majore mucronato, fructu maximo, oblongo, plano, semine membranaceo.*






Pala. lat.

പാലാ Mal.

° كحلج Arab.

പാലാ bram.







## P A L A.

FIG 46.



*Ala* quatuor species sunt, quarum una ejus Fig. 46.  
nominis, secunda *Churutu-Pála* tertia *Coda-*  
*ga-Pála*, quarta *Caicottèn-Pála*.

*Pála* ling. Bram. *Santenu*, est arbor valde  
procera, ramis transversum latè sparsis, na-  
sciturque in arenosis.

*Radix* profundè terram intrans, radículasque suas latè  
diffundens, cortice flavo-obscuro seu rufo, qui lacteus &  
valde amarus est.

*Caudex* crassus duùm triumve hominum amplexus im-  
plens, estque cortice cum ramis cinericeo ac lacteo & ligno  
levi; rami veteres è nodis plerunque tres quatuorve furcu-  
los diffundunt.

*Folia* terna, quaterna, quinave simul furculorum sum-  
mitati in nodo insident transversum in orbem expansa,  
suntque forma oblongo-rotunda, antè rotunda ora seu  
etiam cuspidata, & ad petiolum strictè contracta ac velut  
linguiformia, contextura solida, densa & lactiplena, su-  
perficie plana glabra ac lenia, in recta parte virore fusco &  
nitente, in adversa valde diluto seu albicante ac furdo.

Ex costa crassa, viridi-albicante, quæ etiam in recta tenui-  
ter & altè in adversa eminet ac crassiuscula & lata est, *Vene*  
subtiles numerosæ rectè transversim ac parallelo tractu pro-  
ximè ad marginem exeunt, inde reflexæ in se invicem in-  
currunt, limbum relinquentes in superficie utrinque con-  
spiciuæ rectamque folii partem tenuiter striantes; sunt au-  
tem folia sapore amaro.

*Flores* fasciculatim proveniunt in furculis nodosis & viri-  
dibus, qui supra folia è nodulis ramorum quos complectun-  
tur, rectè prorumpunt, ac plures ut quatuor, quinqueve  
ramulos ex singulis nodulis proferunt singulis ramulis qua-  
tuor, quinque vel plures simul in summitate insidentes;  
sunt autem albicantes, subvirides, constantes quinque fo-  
liis rotundiolis, quæ versùs unguiculos angustiora, in oris  
rugulis crispata ac rigide inflexa versus exteriorè partem;

Q q

nullis-

nullisque venulis striata sunt, insidentque pediculo albicante, qui infernè & supernè crassior est, calyci arcto quatuor foliorum, ac in umbilico seu orificio, folia inserta sunt capillulis orbiculatim cinctus; suntque odoris jucundi & fortis, sed gravis, qui catarrhos & gravedinem excitat ac caput offendit, ob quas noxas invisi sunt.

*Stamina* in floribus quinque tenuia pediculo interiùs inserta & pilis albicantibus obfusa, quæ prope orificium superius apicibus flavis & liberis eminent: inter ea stylus albicanstenuis ac liber est nodulo flavo dotatus, ortum ducens ex capitulo parvo, viridi, quod rudimentum fructus est, ac in calyce situm.

*Gemmae Florum* oblongo-rotundæ & conicæ, ac inter pediculum angusto circulo constrictæ.

*Fructus*, qui plures congregatim furculis appendent, sunt siliquæ oblongæ cubitum ferme longæ, quæ angustæ, compressæ, ac virides, intus lacte plenæ, in se recondentes parva numerosa semina plana, oblonga, cum sua longitudine jacentia in longitudine siliquarum, ac ex anteriori & posteriori oculo penicillum argenteorum filamentorum ejiciunt in unam seriem per filamenta implicita, & colore viridiflavo seu rufo sunt.

Hæc arbor tota lactea est, quod & cæteris speciebus est commune.

*Flores* fert semel in anno in *Januario*.

#### V I R E S E J U S.

**C**ortex ejus tufus & in decocto datus commodus est ventri leniendo, stomacho roborando flatibusque discutiendis ac ardoribus jecoris restringendis; idem in decocto datus addito momento salis & piperis stomachi concoctionem adjuvat. *Idem* tritus & simpliciter in aqua calida epotus prodest in febre frigida, & hoc modo etiam lumbricos enecat. *Idem* tritus unâ cum aqua & ulcere appositus ad ejus sanationem & purgationem confert, quo modo usurpatus etiam prodest pro dolore arthritico. *Corticis* decocti vapor exceptus in parte affecta dolorem mitigat. *Idem* Cortex cum semine *Cudâ-Pariti* coctus in oleo auribus malè seu graviter audientium proficue inditur.

#### F I G. 45.

Cur hæ plantæ, quæ *Palestinae* veniunt, sub una eademque Classe mulerent, vix comprehendere possum, cum toto codo inter se differant, ut ex foliis, flore, & semine liquet: artem potuit huic rei præbuisse, quod

cum omnes eodem modo hæ præbere viderent incole, hinc ad unum genus revulerint: vocabitur ergo nobis prius, *Arbor Malabarica Pemptiphylla, lallajana, siliquis angusta, longissima.*





h. f. a. 10







MALABARICUS.  
CURUTU-PALA.

83

FIG. 47.



*Curutu-Pala*, quæ secunda species *Pala* est, Fig. 47.  
ling. Bram. *Cudò*, est arbor humilis altitudi-  
ne unius hominis duorumve nascens in are-  
nosis.

*Radix* minus demissè subfidet, radices la-  
terales latè quoque diffundens, cortice sub-  
flavo ac lacteo, qui saporis est subamari & pungentis.

*Stipes* pedem crassus evadit, estque cortice lacteo fusco  
& in ramis cinereo.

*Folia*, quæ petiolis brevibus ac crassis in ramis & furculis  
proveniunt, oblongo-rotunda sunt, ad petiolum contra-  
cta, & antè in cuspidem oblongam definientia, con-  
textura quoque solida, lactea, virore in recta fusco & ni-  
tente, in adversa minus claro seu albicante.

Ex costa, quæ in recta etiam parte nonnihil eminet ac al-  
bicans est, plures *Nervi* albicantes ac in adversa solum parte  
eminentes obliquo annulari & satis parallelo tractu exeunt,  
proximè ad oras excurrentes, qui in recta parte tractus sui  
vestigia relinquunt, suntque venulis subtilibus transversis,  
qui folium subeunt, comitati.

*Flores* proveniunt in superiori furculorum parte in petio-  
lis lacteis, rotundis, tenuibus & languidis floribus primæ  
speciei majores in totum albi seu candidi, constantque  
quinque foliis oblongis, quæ ad pedem unguiculis strictis  
ac ad unam partem inflexa oris ex inflexura exterioribus ma-  
gis rotundis, extenuatis ac crispis sunt, ac in medio cras-  
siola nullisque venulis striata, suntque succincti quinque  
foliis viridi-dilutis & cuspidatis.

*Stamina* in floribus quinque interiùs pedi florum inserta,  
ac apicibus flavo-albicantibus dotata, ac inter ea stylus viri-  
di-dilutus & albicans ac bifidus, ac in utraque cuspidè com-  
muni dotatus nodulo è globulo oblongo-rotundiolo ac vi-  
ridi, qui fructus germen est, erumpens; suntque flores  
odoris grati & debilis.

*Fructus* in petiolis plures congregatim, ac bini & bini

R r

ex

ex transverso prodeunt, suntque oblongo-rotundi, exterius cuspidati ac versus inferiora maximè cum cuspidè inflexi duobus lateribus rotundis, quæ acuto margine coeunt, constantes, ac superiori latere protuberantes, suntque cortice crasso & lacteo, primùm viridi-obscuro, dein cum maturi sunt, exterius colore flavo-aureo, interius flavo-diluto, aperiuntque se in superiori latere, ubi futura in longitudine per medium striata sunt.

*Semina* intus quinque, sex, septemve continentur cum filamentis velut ungulis juncturæ appendentia, suntque oblonga, figura valde irregulari accommodata ad aliorum seminum circumposituram; cum immatura sunt, intus aquosa & viridi-diluta, matura membranula exteriore corallina obducta, ac intus constantia officulo fusco minùs duro in quo nucleus albus continetur.

*Flores* hæc arbor fert toto anno, maximè tempore pluvioso.

## V I R E S E J U S.

**R**adicis Cortex tritus & epotus in aqua calida fluxum ventris sistit ac prodest in dysenteria in lacte datus. *Idem* tritus cum aqua & apostematis appositus ea resolvit.

## F I G. 47.

Secundam hanc *Pala* speciem vocare lubuit. *Arborum Malabaricarum lallajonem, fructuata flore, fluita* | lis est, quæ nomine *Karidawal*, ex *Ceylon* fuit transmissa, fructu mentulam sinisæ referente, unde & ei nomen.









*Cedaga-pala. Jac.*  
 தெட்டா நல்ல. *Mal.*  
 نَحْمَا نَحْمَا نَحْمَا *Arab.*  
 மரஞ்சோ *Franc.*





MALABARICUS.  
C O D A G A - P A L A .

85

FIG. 48.



*Codaga-Pála*, quæ tertia species est *Pála*, ling. Fig. 48.  
Bram. *Ategò-Cudò*, est quoque arbor humilis,  
altit. ut *Curutu-Pála*, nascens in arenosis.

*Radix* minùs submissè se demittit, fibrâs  
latè diffundens, cortice rubro-fusco & lacteo,  
qui saporis amari & minùs pungentis.

*Stipes* quoque pedem crassius evadit cortice rufo & lacteo,  
rami autem cinereo.

*Folia*, quæ bina & bina petiolis cùrtis & viridibus prove-  
niunt, maximè conveniunt cum foliis secundæ speciei,  
utpote oblongo-rotunda, anteriùs cuspidata, lactea; ner-  
vi quoque ex costa, quæ in utraque parte eminent, obli-  
quo, annulari ac parallelo tractu excurrunt in adversa solùm  
parte eminentes, verùm hæc majora sunt & latiora ac con-  
textura minùs solida, ac venulis numerosioribus inter  
nervos transversos intus pertexta.

*Flores*, qui supra ex origine foliorum uncialibus petiolis  
proveniunt, etiã candidi sunt quinque foliorum oblon-  
go-rotundorum & angustorum, ac ad unam partem infle-  
xorum, quæ textura densa & crassiola & in oris haud crispa-  
ta sunt cum pedunculo longiusculo candido calyci arcto infi-  
dentes, suntque odoris jucundi & fragrantis.

In medio unus *stylus* ex orificio superiori pedis emicans  
cum stamunculis quinque parvis ut in fl. *Pála*.

*Siliquæ* quoque oblongo-angustæ sunt ac similes illis *Pa-  
la*, sed crassiores ac minùs compressæ, virides, (pithamam plus  
minùs longæ intus quoque lactiplenæ.

*Semina*, quæ quoque numerosa in serecondunt, sunt  
etiã plana & oblonga, ac paulo majora illis *Pála* cum sua  
longitudine jacentia in longitudine siliquarum, ac ex solo  
anteriori oculo penicillum argenteorum filamentorum  
eminentia, ac per filamenta in unam seriem implicita, colo-  
re, cùm vetustiora sunt, viridi flavo seu rufo.

## V I R E S E T U S.

**C***ortex* contritus & epotus in lacte acido sistit fluxum ventris. *Cortex radice* proficiuus est pro fluxu ventris quocunque, siue dysenterico siue lienterico, uti & pro fluxu hæmorrhoidali, eodem modo sumptus. *Idem* in aqua decoctus & epotus servit pro tumoribus corporis. *Radix* trita & cum aqua, in qua oryza lota fuit, decocta, confert pro angina gutturis & colli facta lotionem, servit quoque pro tumoribus corporis eod. modo usurpata, uti & pro dolore arthritico partibus affectis apposita, dentium quoque dolores sedat, vermes in iis enecando, ejus decocto in ore detento. *Semina* in decocto data profunt in febre calida, uti & ardore jecoris ac in podagra; lumbricos quoque enecat.

## F I G. 48.

Hinc denique *Pala* speciei nomen indidimus, quod sit *Arbor Malabarica latifolia, jussu flore odore, foliis oblongis.*

Mirum autem videtur Auctores nostros, nullam videri mentionem facere quartæ speciei, quam sub ini-

tium Cap. *Pala Coccones Pala* appellatur, studio autem an casu illud evenierit, incertum est, cum nec descriptio, nec figura, inter transmissas schedas fuerit inventa.







X c. 10



*Tinda-pârua. lat.*

• கஞ் பறவ *mal.*

عُرْوَة *Arab.*

पायड़ी *brah.*





MALABARICUS.  
TINDA-PARUA.

87

FIG. 49.



*Arna* duæ species sunt, *Tinda-Pârna*, & *Ana-Pârna*. Fig. 49.

*Tinda-Pârna* ling. Bram. .... est arbor procera, nascens in arenosis.

*Radix*, quæ fibris terræ se affigit, cortice crasso, albicante ac subflavescente, molli, lacteo, saporis astringentis & ligno albicante.

*Stipes* ambitu unius hominis amplexum implens, cortice cinereo sublacteo, ut & rami & furculi, qui sub corticula exteriori viridi-fusci sunt.

Folia, quæ brevibus petiolis hinc inde insident, oblongo-rotunda, antèrius nonnihil cuspidata, ad petiolum contracta, in margine denticulis tenuiter incisa, intus sublactea contextura rigida seu dura.

Ex costa media, quæ etiam in recta nonnihil eminet, at magis in adversa *Costæ* laterales egrediuntur, quæ à margine arcuatim reflexæ in se invicem deferuntur, suntque nervis intercurrentibus intertextæ, ac in adversa solum parte, quam scabram reddunt, solum eminentes; folia col. in recta viridi-fusci, in adversa viroris communis.

*Flores* in capitulis plano-rotundis, quæ petiolis simplicibus curtis furculis hinc inde insident, ut gemmæ plures unitæ prodeunt, suntque quatuor foliorum cuspidatorum, viridi-dilutorum.

*Stamina* in iis quatuor ex foliis longè emicantia, quæ singula in cuspide uno nodulo albicante grandiusculo sunt dotata. Stylus in medio brevissimus cum capitulo albicante.

*Fructus* sunt baccæ rotundiolæ quæ suo calyce quatuor foliorum primùm arctè obtectæ sunt, & è vertice stylum bifurcatum ejicientes, corticis tenuis, primùm virides, dein albescentes; cum maturæ, colore rubicundo & parùm nitente; unum capitulum gemmeum nonnisi unum fructum profert.

In fructibus sub cortice exteriori tenui unus *Nucleus* rotundus, viridis, qui proprio nonnihil cartilaginoso rufescente cortice tegitur, continetur.

T t VIRES

## V I R E S E J U S.

**E***fus* decoctum in lotionē corporis servit pro febre calida.  
*Radix* confert pro morbo sacro trita & cum aqua oryzæ  
 in lotionē adhibita. *Eadem* trita apostematis apponitur: folia  
 decocta proficua sunt pro doloribus quibuscunque parte af-  
 fecta cum iis linita; eodem quoque modo juvant in puer-  
 peris.

## A N A - P A R R O A.

**A***Na-Párua*, quæ secunda species est *Párua*, ling.  
 Bram. *Bendarli*.

## F I G. 49.

Prior hæc *Parua* species appellanda videtur *Arbor*  
*Malabarica* *Bastifera*, cortex albicans, glomerat flor-

nomine tenus, Sub finem hujus capituli attingunt Auto-  
 reâ nollâ, ejusque nec descriptionem, nec figuram ex-  
 hibent, hinc de plura de ea addere non licuit.



C A V A.





*Caralam. ser.*  
 നാലൂ. *mal.*  
 كحلاوعلام *Arab.*  
 ब्रेकजा *bra.*







## CAVALAM.

FIG. 50.



**C**avalam, ling. Bramanum, *Bencarò*, est arbor procera ramis densis transversim sparsis, nascens in petrosis & arenosis. Fig. 50.

*Radix* crassa recta in terram se demittens ac hinc inde à latere ac subtus fibris vestita, cortice albicante seu cinericeo & crasso, ac minus duro, qui saporis est aquei & subamari.

*Caudex* crassus unum circiter hominis amplexum, ac crasso indutus cortice, qui exterius cinericeus ac subcinericeo-viridis, intus ex viridi albicans ac humidus, ligno albo, quod conflatum in filamenta protrahitur.

*Folia*, quæ hinc inde petiolis mediocriter longis, rotundis, viridi-claris & ad exortum atque ad folium extuberantibus proveniunt, oblongo-rotunda sunt, longitudine unam ipithamam cum duobus tribusve pollicibus æquante, quæ ad latitudinem ferme est tripla, rotundis ad petiolum oris & tenuiter contractis, ac antè in mucronem parvum, qui versus unam partem passim reflexus est, contracta, crassitie mediocri, plana, lenia, glabritie in parte recta nitente, colore viridi-obscuro in utraque parte, at in recta virore fusiori, odore agresti.

Ex colla intermedia *Costule* viridi-claræ in adversa parte eminentes obliquo ductu anteriora versus exeunt cum ea in recta etiam conspicuæ ac à margine in plures arcus minores incurvantur, qui nervulos transversos hinc inde distribuunt: suntque folia inter hosce nervos subtilis texturæ, utpote venis subtilibus intertexta.

*Flores* fasciculati proveniunt in petiolis ramosis, viridibus & pilosis, qui vel solitarii, vel etiam bini & bini ex superiori parte furculorum erumpunt: suntque parvi, constantes quinque foliis angustis & cuspidatis cum suis cuspidibus interiora versus inflexis, ac mutuo ad unum nodulum unitis & clausis quo rosam fenestratam repræsentant; sunt autem folia oris exteriora versus inflexa, ac utrinque ad oras pilis transversis longiusculis obsita, exterius viridifusca

fusca ac subrufa, interiùs ex viridi-flavescentia oris valde lenibus rubro-fuscis, quæ instar rubri *Veluti* sunt; è medio stamunculum viride exit cum apice seu nodulo crassiole & flavo.

*Gemmae Florum* oblongæ & nonnihil conicæ sunt, pilosæ, virides ac rubescentes; ubi flores in gemmis prorumpunt, foliis omnibus nudatur arbor, quæ cum fructibus rursus resumit.

*Fructus*, qui crasso communi petiolo pedunculis crassis, bini, terni, quaterni, quini passim congregati insident, rariùs solitarii, suntque hi cum teneri sunt & congregati plures simul proveniunt, in unum arctè juncti & capitulum, quod totidem laterum, quot numero sunt, ac muscosum seu spadiceum & villosum est, ac ex calyce florum prodit, ac dein relaxato capitulo in transversum cum justa magnitudine sunt rotundi ac parùm oblongi, cortice crasso ac duro, aurantio qui carne interiori albicante est ac intus membrana lacunosa, cartilaginosa seu cornea ac subflava obductus constantes, ab una parte dorso emicantes, ab altera in ventre sutura ex pediculo per medium in longitudine sulcati, quâ præ maturitate laxata defluit materia viscosa seu gelatina, quæ instar mucilaginis exteriorem fructuum superficiem lubricat eamque hinc inde obducit.

In hisce fructibus, qui lata capacitate sunt, *Fabæ* novem, decem vel minus oris suturæ umbilicis affixæ sunt utrinque quatuor, quinque versus dorsum pendentes, suntque crassæ, rotundæ & oblongæ, longitudine unius ferme pollicis ac glabræ, corticibus duplicatis, dum tenella, mollibus & albis; qui exterior cortex instar cuticulæ est tenuis, ac faba matura coloris nigerrimi, in superficie exteriori nitentis, consistentia adeo fragili, ut in minutâ frustula velut cortices igne assati ex attritione hiscat; qui interior crassior, duriolus ac puniceus, exterius obductus pulpa mucilaginosa & albicante, intus vestitus tenui & subrufo pellicula, quæ nucleum seu pulpam fabæ albam ambit; suntque fabæ tostæ in edulii.

*Flores* hæc arbor in anno semel fert in *Februario*.

Apud hosce medicos non est in usu.

#### F I G. 50:

Hujus arboris nucleum integram, copiosissimis seminibus repletam, *Talea* nomine, ex *Zelus* præcedentibus annis accepi, quæ tamen licet probe matura, germen nunquam prodidit: flores sterces humanum quodammodo redolere, scribat *D<sup>m</sup>. Hermann*: & quia hujus attributi nullam faciunt mentionem Auteurs

nostri, hinc etiam dubius hæreo, an *Talea Cingulifera*, non potius sit huic affinis censenda, quam eadem ipsi arbor. Iterum cum ad *Nucis* species pertineat, hinc nomen dedi *Nucis Alabæricæ sulcatae, mucilaginosæ, fabæ*.

A.M.





Ambalām. lac.  
അമ്പലം. Mal.  
عَمْنِيَّاحُ. Arab.  
आवाग्रे. bram.







## A M B A L A M.

FIG. 51.



*Ambalam* duæ species sunt, quarum una Fig. 51. ejus nominis, altera *Cdt-Ambalam*, seu *Pet-Ambalam*.

*Ambalam* Br. *Godoe-Ambadò*, est arbor procerâ, ramos in altum minus latè in transversum diffundens, nascensque in arenosis.

*Radix* longa est, fibris permultis capillatis terræ firmiter adhærens.

*Caudex* crassus, unius hominis amplexum implens, cortice vestitus crasso, ligno molli.

*Rami* vetustiores lignosi & cinericei, corticeque astringente; teneriores autem virides ac cæruleo rore conspersi.

*Folia*, quæ in furculis teneris ac viridibus ac ad exortum extuberantibus, interius striatis passim quina, ac ordinatim bina & bina cum uno folio in vertice pedunculis brevissimis ac interius planis proveniunt, sunt oblongo-rotunda, longitudine ad suam latitudinem ferme dupla, antè parva ac contracta cuspide, suntque densè contexturæ, mollia, lenia, glabra ac utrinque nitentia, virore fæto, in adversa autem claro; quæ exortui furculorum folia proxima sunt, minora reliquis, maximum autem quod in vertice appendet.

Ex costa media *Nervi* in adversa parte eminentes transverso recto ac parallelo ductu exeunt, in recta, in qua costa non nihil eminet, solum conspicui, excurruntque proximè ad marginem, ubi reflexi in se invicem incurrunt limbulum ad marginem relinquentes, suntque ramulis eminentibus & cancelliformiter unitis intertexti; folia autem odore sunt forti, & sapore acido-delectabili, ut cortex fructus *Mangæ Indicæ*.

*Flores* proveniunt in furculis teneris, viridibus; qui ex ramorum vetustiorum summitate prodeunt in minoribus ramulis plures congregatim proveniunt, suntque teneri hi furculi saporis acidi & parùm amari, similis ei qui in fructibus *Mangæ*, odore quoque forti & acido: flores autem par-

vuli ac albi & velut stellulæ quinque vel sex foliorum cuspidatorum, quæ oris rotundiolis in cuspidem contracta, nec non rigidiuscula & nitentia.

In medio florum *Corculum* est flavum, ex ejus orbita ad folia *Stamina* parva, tenuia, albicantia, ac in vertice flavis apicibus dotata emicant decem vel duodecim, prout flores vel quinque-folii vel sex foliorum sunt, & ex meditullio corculi quinque vel sex minutæ cuspides vel styluli eminent, estque corculum primordium fructus.

*Calyx* *Florum* est pro numero ejus foliorum quinque vel sex constans foliis flavo-albicantibus ac brevicuspidatis, ac cum suis cuspidibus inter folia florum situs.

*Gemmæ* *Florum* rotundæ sunt, primum virides, dein albicantes, sub illud tempus, quo flores prorumpere incipiunt, in gemmis, arbor hæc omnibus suis foliis nudatur, ac quamdiu floret, iis destituta est, cum fructibus rursus nova folia resumens.

*Fructus* in furculis, quibus flores infederunt petiolis longiusculis, crassis, languidis, pandis & cinereo-fuscis, plures congregatim seu fasciatim pendunt, suntque oblongo-rotundi ac duri, similes fructibus *Mangæ Indicæ* vel glandulis nostris, ut in suo viridi cortice sunt; cum immaturi sunt colore viridi-fusco, ac pulpa succulenta, quæ est saporis acidi, maturi verò coloris viridi-clari, dein sub-flavi, ac aciditate jucunda gustui & odorati, suntque indigenis in edulibus.

In medio officinati duro ac grandi osse quod totam ferme fructus capacitatem replet, ac exterius nervis lignosis albicantibus retiformiter striatis contextum est, & hinc inde sub contexturâ lacunosum ac punctationi pervium, intus durum.

Duabus vicibus in anno hæc arbor fert *Flores* & *Fructus*; *Flores* in *Januario* & *Julio*.

Bramanis *Godol-Ambado*, est *Ambado* dulcis, sic dicta, quod fructus sint acido-dulces ac gustu delectabili.

#### V I R E S E T U S.

**F**luxum menstrui suppressi promovet, si *Radix* pudendis mulieris indatur. *Cortex* ejus tritus & in lacte acido eporus dysentericæ sistendæ commodus, ad quod etiam juvat, si ejus succus miscetur cum oryza, ex qua genus panis communi nomine, *Apen* dictus conficitur. *Ligni* decoctum proficiuè datur in gonorrhæa. *Foliorum succus* cum fructu arboris trito auribus inditus eorum dolorem sedat.

#### F I G. 51.

Cum arborem hanc cum *Mangæ* vulgo dictæ non exiguum habere similitudinem testentur Auctores nostri; idcirco non ineptè ad hoc quoque genus referri posse arbitror: præsertim cum vox *Ambadam* *Malabaricum*, & *Ambado* *Bramanum*, non male cum *Cassareum* *Amba* & *Perfarum* *Amba* (quæ *Mangæ* vocatur) conveniat. Verum cum utalibi dixi, fructus hic plurimum

variet, ejusque species obiter duntaxat ab omnibus auctoribus proponantur; & *Mangæ* illud aliud genus, quod à *Lawson*, & ex eo à *C. Bauhino* in *Pinax* exhibetur, non nisi nomine innoverit, hinc certi aliquid determinare non possum. Appellandum interim putem *Mangæ affinem*, flavo-purpureo, nucleo majore esse.

CAT.



MALABARICUS. 93  
CAT - AMBALAM.

FIG. 50.



*At-Ambalàm* seu *Peè-Ambalàm* lingua Brama- Fig. 50.  
num *Coducò-Ambadò*, quæ secunda species est  
*Ambalàm*, cum priori maximè convenit, ve-  
rùm

*Folia* hujus minùs grandia & minùs oblon-  
ga sunt, quàm illa *Ambalàm*.

*Fructus* quoque passim minùs oblongi ac nonnihil ro-  
tundiores & paulò minores, nec tam uberi copia in fur-  
culis proveniunt, saporis acido-amari, ob quem minùs  
sunt in eduliis.

*Cat-Ambalàm* seu *Peè-Ambalam* est *Ambalam* sylvestris: *Co-  
ducò-Ambadò* Bramanis est *Ambadò* amara, sic dicta quod fru-  
ctus sint acido-amari.

Hæc cum prima ejusdem est virtutis dictis modis usur-  
pata.



Y y

AGATY.







Ayati. Lat.  
 ഏതരൂ. Mal.  
 اغصاطيب. Arab.  
 അഗസ്താ. brahm.



## A G A T T.

FIG. 53.



*Gaty*, lingua Brāmanum *Agast*, est arbor Fig. 53.  
 altitudine quatuor, quinqueve hominum,  
 ramos surrectos è caudicis summitate & ex  
 medio corpore in altum, minùs verò in la-  
 tum ejiciens, nasciturque in arenosis.

*Radix* fusca, fibras capillatas longe late-  
 que diffundens, cortice sub exteriori crusta fusco-rube-  
 scente, ac saporis astringentis.

*Caudex* crassus, hominis unius amplexum ambitu æ-  
 quans, ligno molli, & corculo intus mollissimo, cortice  
 inciso humor extillat tenuis & aqueus, qui postea incrassat  
 ac gummosus redditur.

*Folia* proveniunt in furculis tenuibus, languidis, viri-  
 di-dilutis, sesqui-spithamam ferme longis, interiùs striat-  
 is, qui ad originem extuberant, iisque binæ & binæ in dua-  
 bus seriebus pedunculis brevissimis insident, ac anteriora  
 versus conversa furculos medios ad angulos æquales ferme  
 cum superficierum planis intersecant: suntque parva, for-  
 ma oblongo-rotunda, anteriùs quoque rotunda ora, lon-  
 gitudine sesqui ferme pollicis, & latitudine unius digiti  
 transversa, ac ad exortum & ad summitatem latitudinis fer-  
 me uniformis, contextura crassiola & valde mollia, super-  
 ficie lenissima, viroris communis & surdi in recta, in ad-  
 versa viroris parùm diluti, suntque odore hortensi, & ubi  
 manibus teruntur, fabaceo.

Ex costa media, quæ in adversa eminet, *Venule* intra fo-  
 lium subtiles egrediuntur. Vespera ac de nocte folia in iis-  
 dem seriebus mutuo attactu superficierum clausa sunt, & in  
 se invicem decumbentia.

*Flores* hinc inde in uno communi petiolo viridi-diluto,  
 qui supra ex origine petiolorum seu furculorum foliaceo-  
 rum prodit, quatuor, quinqueve plures congregatim pro-  
 veniunt, suntque fabacei constantes foliis quatuor, uno folio  
 surrecto, lato cum stylo medio, qui ei accumbit, curva-  
 turæ unguli-formis ac velut ungulam efficiente, ac duobus

Z z

foliis

foliis angustis & surrectis, quæ etiam unguli-formis curvaturæ, ac à latere ungulam amplectuntur, suntque hæc tria crassiola, albicantia, & in longum venis striata: quartum, quod anterius est, & versus quod ungula inflexa & aperta, est oblongo-rotundum, latissimum ac pertenuè, venulisque subtilibus ac numerosis ex unguiculo in longum striatum, primum unguolata folia tanquam involucrium com-plectens, dein pendulum & se corrugans, colore primum albicante, dein flavescente, postmodum rubescente, ac ex rubro purpurascete.

*Stylus* singuliformis in summitate fissus in filamenta, quæ apicibus flavis ac oblongis ornata sunt, ac ad concavam partem, quæ folium latum, oblongo-rotundum respicit, sulcatim aperti, & filamentis albicantibus libere, qui suum quodque apicem in vertice gerit, obductus, reconditque in se filamentum viride: quod ex pristino die fructus in calyce sito excurrit: suntque flores odore nullo.

*Calyx* profundus est, rotundus ac latus, & quatuor brevium rotundiorum foliorum unguiculos foliorum circumdatus, colore viridi-lilato.

Floribus deciduis succedunt *Siliquæ* oblongæ angustæ, rotundioræ, rectæ, virides, quæ quatuor spiculas longæ, & digitum transversum latæ, cortice crasso sunt, in us *Fabæ* oblongæ singulæ in propriis loculamentis, quæ parietibus carnosæ sejunctæ sunt cum sua longitudine in longitudine siliquarum consistat, ac cum ungula seu umbilico in medio futuræ laterum siliquarum ad unam partem affixæ, atque nonnihil sub cortice extuberantes, suntque saporis fabacei, & similes phaseolis nostris nisi quod minores, primum virides, dein albicantes, seu ex albicante subvirides, suntque in edulis.

*Flores & Fructus* hæc arbor fert tempore pluvioso duabus tribusve in anno vicibus, etiam toto anno sed rarius.

## V I R E S E J U S.

**I**N podagra proficua, si ex *Partibus ejus* contritis fiat decoctum cum oleo, ac eo pars affecta perungatur. Radix mixta cum urina vaccæ humores tumoresque membrorum resolvit, us appositæ. *Arboris Corticis succus* in ore detentus, idem cum melle permixtus prodest pro angina & oris pustulis, si cum eo guttur & os abluantur. *Cortex* coctus cum aqua & comestus pro variolis conducit. *Foliorum succus* naribus immixtus juvat in febribus quartanis & inveteratis die paroxysmi. *Foliorum decoctum* epotum pituitam & phlegma, nec non humores biliosos expurgat; in vertigine capitis & colera conducit, si *Folia* cocta in aqua edantur. *Flores* in decocto proficue dantur pro catarrho; quin etiam hoc modo ad luxuriam incitare ferunt; eorum *succus* oculis immixtus pellit nubeculam ac visum noctu precipue reddit.

## F I G. 51.

Quæ plurimas notas obcinet hæc planta, quæ cum *Sesban Alpe*, sive *Galga Alpina* siliquis articulatis C. Bauh. & *Agropyrum* hinc non incongruè vocandum arborum *Galga Alpina* *Malabarica arboriscentem*, siliquis majoribus articulatis. *Sesban autem* plurim *Alpe*, *Spheram*, & *Alpe*, in regno Ceylonis non esse infrequentes; sicutat inde ad nos, unum cum feminibus transiit Plantæ, absurdè nomen siliquis.

CAD A.








*Pala-pilava* L.  
കുടലിയമ്പു mal.

فَخَا صَيَّاجِيَّةُ Arab.

മാകുക്ക bran





## CADA-PILAVA.

FIG. 52.



*Ada-Pilava* ling. Bram. *Ma Cda-Pala*, est arbor nascens in arenosis & petrosis. Fig. 52.

*Radix* cortice sub crusta nigricante-croceo.

*Surculi* superiori parte quadrangulati & sulcis striati, nodulisque extuberantes.

*Folia*, quæ in surculis è nodulis bina & bina & ex utraque parte in eodem ordine petiolis crassis rotundis, interiùs nonnihil planis proveniunt, grandia, oblongo-rotunda, ad petiolum contractiora & anteriora versus rotundis oris in cuspidem desinentia, contextura crassa, mollia, superficie plana, lenia, virore fusco & nitente in parte recta, in adversa claro, sapore sylvestri & subamaro.

Ex costa intermedia, quæ crassa est, viridi-diluta seu albicans, in adversa altè eminens, *Costæ* quoque viridi-dilutæ obliquo, annulari & parallelo ductu exeunt, proximè ad marginem ac inde reflexè venis in se invicem deferuntur, suntque in recta quoque parte nonnihil eminentes venulæ transversis, quæ haud eminent, intercurrentibus commixtæ; folia quæ surculorum superiorum partibus adherent, sensim minora ac minora, petiolisque magis brevibus appendentia.

*Flores* supra ex fructibus proveniunt constantes foliis quatuor, quinqueve oblongo-angustis, cuspidatis, stelliformiter expansis, crassis ac venulis ad visum minùs conspicuis, suntque interiùs candidi; exterius ex viridi-diluto albicantes, habentque pedem rotundum longum viridi-dilutum & albicantem.

*Stamina* in floribus quatuor, quinque, sex, pro numero foliorum florum, brevia, subflava prodeunt, suntque velut lingulæ, quæ ad unguitulos foliorum orificio pedis insertæ sunt; cum iis emicat stylus viridis qui ad summitatem crassior, bifidus ac obscure rufescens, estque pes florum, per quem is transmittitur, interiùs villo seu densis pilis oblitus.

A a a

Gemme

*Gemmae Florum* oblongo-rotundæ & flavo-albicantes.

*Fructus* in caulibus è nodulis ex adverso foliorum proveniunt in petiolis longioribus, sesquiuncialibus, rigidis, viridibus & crassis, suntque forma oblongi, ad petiolum crassiores, in summitate strictiores, exterius distincti cancellis extuberantibus, oculatis, versus summitatem minoribus, ex quorum oculis gemmæ, quæ in medio oculatæ sunt, emicant ac extuberant, suntque colore primùm viridi, in gemmis oculatis albicante, dein cum maturi, quoque albicantes, intus carne albicante, odore cum maturi sunt tetro & stercoreo, sapore amaro, flores qui supra in hisce fructibus proveniunt, cum suo pede gemmis ipsis insident, ac ex oculo, qui in medio gemmarum est, stylum suum accipiunt, suntque flores semper maximè conspicui plures arcte ad se invicem in summitate fructus cæteris ex gemmis inferioribus deciduis.

*Semina*, quæ in fructibus forma oblonga & plana, jacentque ordinate propius ad corticem cum suâ longitudine ad gemmas, ex quo flores erumpunt erecta, ac carne intermedia à se mutuo sejuncta, suntque colore, cum sicca sunt, nigricante.

Bis in anno fert flores.

#### V I R E S E J U S .

*Succus ex ea* integra expressus ac cum oleo ex foliis fici interni decoctus parti affectæ podagræ convenit, si cum eo perungatur; ad quod etiam servit perunctio radicis contritiæ & mixtæ cum aqua.

#### F I G. 52.

Describitur hæc arbor nomine *Conifera*, *Alcan-*  
*don* *Javanensis*, à *Bontu* Hist. Natural. & Med.  
lib. vi. cap. vii. Ubi flores *Perichymen* floribus assimilat, & *Conifodan* *Indicum* arborem, nominari vult, à viribus, quas in *Hemipryi* insignes, scilicet in Nosocomio publico, frequentissimè observasse testatur. Ad-  
ditque, fructus sub cineribus assuetos à *Malais* comedi,

ad dysenterias, cholera, & pectoris vitia; folia quoque sarcotica esse, & in vulneribus, & ulceribus, carnem egregiè generare, & cutem cicatrice obducere; in quam rem sal ex foliis, arte Chymica quoque elici potest, quod præter consolidantem qualiterem, etiam quavis inveterata, & cæcilethica ulcera, munda reddit.

APPEL-






Appel. Lat.  
 അപ്പിൾ mal.  
 ابل Arab.  
 स्वाजोमनवनं bram.







## A P P E L.

FIG. 53.



*Ppel* seu *Nalla-Appella*, lingua Bramanum <sup>Fig. 11.</sup>  
*Carò-Nervóloe*, est arbor mediocris altitudi-  
 nis, nascens in arenosis.

*Radix* crassiola plurimas fibras pilosas  
 transversim emittens, estque colore croceo  
 ut & odore.

*Caudex* quinque aut sex palmos convolutos crassus eva-  
 dit, ramos surrectos in altum diffundens, ligno albicante  
 & corculo intus fusco-fusco.

*Surculi* teneri, virides, quadrangulati, & in unoquoque  
 latere sulco striati.

*Folia*, quæ in ramis furculisque petiolis brevibus, rotun-  
 dis, viridi-dilutis bina & bina proveniunt, ac in ordine  
 se invicem oblique decussant, forma oblongo-rotunda sunt,  
 antèrè brevè & angustà cuspide, ad petiolum rotunda ora,  
 in oris superioribus minutis ac raris apicibus, alia magis,  
 alia minùs eminentia, contextura crassiuscula, solida &  
 mollia, superficie plana & glabra ac lenia, in interiori  
 parte viridi-fusca & nitentia, in exteriori viridi-diluta,  
 odore hortensi acuto haud ingrato, sapore amaro &  
 subacri.

Ex costa media utrinque quatuor aut quinque *Costulae* ob-  
 liquo annulari tractu exeunt, quæ ad oras arcuatim reflexæ  
 in se invicem subtilibus arcubus deferuntur, suntque costæ  
 viridi-clarissimæ, in adversa parte eminentes, ac etiam  
 tenuiter in recta, comitanturque venulis subtilibus ac can-  
 cellatim densè contextis.

*Flores* umbellatim proveniunt, suntque parvi, coloris  
 albi, seu ex viridi-diluto albicantis, constantes quatuor  
 foliis minutis & rotundis, quorum unum quod majuscu-  
 lum est & latius se aperit, magis albicans, reliqua quæ ma-  
 gis clausa, viroris nonnihil diluti, ac minùs albicantia,  
 habentque in medio quatuor tenuia, albicantia stamina,  
 quæ albicantibus & rotundis apicibus dotata sunt, ac sty-  
 lum tenuem albicantem seu viridi-dilutum, bifurcatum ex

Bbb

ro-

rotundo, viridiglobulo, qui ex calyce rotundo emergit, ac primordium fructus est, emergentem, suntque etiam odoris fortis non injucundi.

Floribus deciduis *Baccæ* rotundæ prodeunt, quæ cum immaturæ, sunt coloris viridi-diluti, maturæ autem coloris fusci seu nigri, intus ossiculum rotundum continentes.

Tota arbor est odoris acuti & hortensis.

Semel in anno fert *Flores* & *Fructus*.

*Oleum* ex radicibus per distillationem extractum tenue est & clarum coloris aureo-flavi & rutilantis, odoris vegeti & pergrati, saporis subacris & subamari, in distillando cum aqua simul ascendit eique innatat.


#### V I R E S E S U S.

**T**otius plantæ virtus inservit pro capitis totiusque corporis doloribus, si cum ejus decocto caput & corpus abluatur, atque eodem modo servit pro doloribus arthriticis, succus ex plantæ decocto extractus & saccharo conditus optimè in medicamentis usurpatur, quæ pro affectione mala ex causis frigidis oborta dantur. *Radix* contrita & epota cum aqua lenteriæ commoda, cum salsa & marina cocta sedat dolores podagræ parti affectæ applicata. *Cortex* contritus & minutus cum melle etiam valet ad lenteriam sistendam cataplasmate facto. *Folia* dolores ventris pectorisque ex flatibus obortis mitigant ac solvunt in decocto data. In febre frigida proficuum est decoctum ex *Foliis* cum pipere trito & ebibitum, vel si cum decocto *Foliorum* lotio instituat. *Oleum* ex *Radice*, seu potius *ejus Corticibus* extractum prodest etiam pro febre frigida, uti & doloribus ventris flatusque discutit unctum in partibus affectis.

#### F I G. 53.

*Arbor Malabarica haccifera, flore parvo, umbellato, odore,* *etiam, ossiculum continens, obdure.* Si quia interius non incommodè vocari posset meo iudicio hæc arbor. *ad Arabum sirsibum referre malit, non multum eum*  
Ad sambuci speciem non dissimilem, in fru- *quoque à vero aberrantem crediderim.*





*Ameri. lar.*

అమెరి mal

عُشْقَرِي Arab.

అమి gram.





## A M E R I.

FIG. 54.



*Meri* ling. Bram. *Nely*, est arbuscula alti-<sup>Fig. 54.</sup> tudine unius hominis, ramos maximè transversos emittens, nascensque in arenosis & petrosis.

*Radix* albicans, lignosa, densis fibris vestita.

*Stirps* Brachium crassus evadit, estque ligno duro.

*Folia* in furculis tenuibus, qui è ramis suis paralleli exeunt ac ad exortum extuberant, & interiùs striata sunt, bina & bina in duabus seriebus proveniunt, iisque brevissimis pedunculis infident, ac quina, septena, paria cum uno in vertice, suntque parvula, forma oblongo-rotunda, anteriùs & ad petiolum rotunda ora, contextura tenuia & densa, superficie plana ac lenissima; cum costa media in adversa parte ex qua nullas costas conspicuas emittit, coloris viridi-sub-coerulei, in recta fuscioris, in adversa clari, in utraque furdi; saporis subamari & languidi ardoris diutius masticata.

*Flores* in brevibus furculis, qui ex origine furculorum foliaceorum erumpunt, plures congregatim seu spicatim proveriunt, suntque parvi, fabacei, constantes quatuor foliis, unum folium est unguli-forme, & clausum, ac viride cum stylo quem continet ungulam efficiens: duo folia angusta, tenuia sunt, ac una interiori ora recta ac saturo-rosacco rubore complectentia ungulam; quantum folium versus quod ungula inflexa est, oblongum & latiusculum, tenue ac viridi-dilutum, exteriora versus reflexum versus summitem petioli, quem flores circumfident, situm; suntque flores odoris nullius.

In medio emicat *Stylus* viridis, cavus instar thecæ filamentum tenue, quod è siliquoso germine prodit, recondens, ac superius in parva ac tenuia stamuncula fissus, quæ minutis albicantibus apicibus dotata sunt, ac ad concavam partem uno filamento obductus.

*Calyx* *Florum* quinque cuspidatorum & viridium foliorum est.

Ccc

Gem.



*Gemma Florum* oblongo-rotundæ sunt, ac ad unam partem, in qua folium latiusculum se aperit, nonnihil planæ.

*Floribus* deciduis succedunt parvæ ferme unciales, rectæ, rotundiolæ & angustæ *Siliquæ*, suis furculis brevibus, tenuibus pedunculis appendentes, coloris primùm viridis, dein spadiceo-fusci, ac ad petiolum calyce quinque foliorum comprehensi.

*Semina* oblongo-rotunda sunt cum suâ longitudine jacentia in longitudine filiquarum, quæ cum matura, coloris fusci & nitentis sunt.

Hæc arbuscula bis in anno tempore pluvioso & æstivo dat flores.

## P I R E S E J U S.

**A**D dolores calculi nephriticos mitigandos servit *Radix* in decocto data. *Eadem* & viribus veneni obsistit decocta cum aqua *Lanie* scilicet teneri *Coqui Indici*, & epota. *Folia* in difficultate mingendi juvant si trita cum aqua ventri applicentur. *Amē*, vulgò dicta *Indigo*, quæ ex *Foliis* paratur, pro exsiccandis tumoribus proficua.

## F I G. 34.

*Anil*, ex qua *Indigo*, hic exhiberi, non est quod quis dubitet: quoniam autem referenda sit hæc planta, minus inter sese consentiunt auctores. C. *Randus* in *Pinace Indica* sive *Glossa subjungit*, vocatque *Glossa affinis*. Alii autem lib. p. Sect. 111. capite de *Phaetolis Indici*, siliquam ejus describit, à D<sup>o</sup> *Ternaro* ex India missam, cum sequenti inscriptione. *Siliquula ut fœmen, hinc chavala crepata, est herba Anil, nec est species Glossa, sed legumen. Gertius ab Hæro Anil in doliis & Turco vocari asserit: Geyzerius siliam autem, apud quos frequens, Geli, & nunc plerique Nil, herbamque esse Oryza similem. Clarissimus Pijé in Brasilia pessum luxurians tradit plantæ *Cachira* ab incolis dictæ, binas species, unde *Anil*: priorique flores purpureos ex albo dilatos, tribu-*

it, odoris fragantissimi. *Racheforus*, in Americæ insulis, trium pedum altitudinem vix aquare ait, & florem obtinere albicanssem, odoris ingrati, locus ac illam speciem, quam in Insula *Madagascariæ* provenire scribit, quæ exiguos flores purpureos ex albo variegatos præbet, jucundi odoris; eademque procul dubio est cum *Pijéno*, vocaturque in Historia *Madagascariensi* *kaaghera*. Ipsum autem plantam ab Autoribus nostris descriptam, ex *Zeilan* hoc anno transmissit D. *Bernardus*, additæ sequenti inscriptione: *Polygala Indica frutescens, ex casu siliis Anil sive Indigo confusæ, verum Anil Ceylonensi velum est & ignobilis, ex quod ex Malabar, Comandel, cui Negapacan adferre. Congestissilis vocatur Anil.*



C O L E





*Colicil. lat.*

കൊളിക്ക. mal.

كالحيل. arab.

കാലി. bra.





## COLINIL.

FIG. 55.



*Olinil* ling. Bram. *Schéra - Puncá* est arbu-<sup>Fig. 55.</sup>  
scula humilis, altitudine duum triumve  
pedum.

*Radix* fibrosa cortice albicante seu ruffo,  
qui saporis est amari & subacris, intus li-  
gnosa & albicans, odoris nullius.

*Stipes* quatuor digitos crassus evadit, ramosque maximè  
transversum diffundit, estque ligno duro, cortice sub ci-  
nerea crusta viridi, qui saporis est amari & mordacis.

*Folia*, quæ in furculis angulatis, tenuibus, viridibus,  
hinc inde parvis petiolis proveniunt, parva, oblongo-ro-  
tunda, antèrius rotunda ora ac maxima latitudine versus  
superiora ad petiolum in angustum rectis oris contracta, in  
recta parte viridis communis, in adversa hyali seu viridi-  
subcœrulei, in utraque furdi, saporis subacris & subamari,  
ac languidi ardoris diutius masticata.

Ex costula, quæ in adversa tantum parte eminet, *Vena*  
obliquè & recta transversim excurrunt ductu parallelo in  
marginem incurrentes, tractu in recta & adversa parte con-  
spicuo, cum franguntur, ad tractum venarum angulo ad  
costam concurrente se dividunt. Foliis sapor amarus &  
mordax.

*Flores* parvi sunt & fabacei, constantes quatuor foliis,  
unum unguli-forme, clausum ac multum inflexum cum  
stylo, quem continet, ungulam constituens, estque viridi-  
albicans; duo angustiora una interiori ora recta valde sa-  
turo ac rosaceo rubore ungulam ad latus complectentia;  
quartum, versus quod ungula inflexa & aperta est, latum,  
primùm folia duo cum ungula circumplectens, dein flore  
aperto versus exteriora reflexum, situm versus summitatem  
petioli floriferi.

*Stylus* viridis, cavus instar thecæ, filamentum viride,  
quod è germine filiquoso prodit, complectens, ac superiori  
parte in parva ac tenuia stamuncula, quæ apicibus flavis no-  
dulata sunt, fissus & ad concavam partem uno filamento

D d d

libero,

libero, qui flavo quoque apice nodulatus est, obductus.

Floribus deciduis succedunt *Siliquæ* oblongæ, angustæ, tenues, planæ & ad unam partem nonnihil inflexæ, duos trefve pollices longæ, glabræ, primùm virides, dein rubro-fuscescentes.

*Semina* seu *Fabæ*, quæ intus sunt, à se mutuo per ipsam carnem siliquæ sejunctæ, oblongo-rotundæ, planæ, cum sua longitudine jacentes in longitudine siliquarum, cum umbilico ventri siliquarum affixæ, primùm virides, dein nigricantes.

Præter siliquas *Fruitus* nostri virides, tenuiter pilosi ac duriori furculis sæpe insidere conspiciuntur, qui in vertice sunt foramine pertusi & intus cavi.

Bis in anno fert *Flores* & *Fruitus* tempore pluvioso & æstivo.

## V I R E S E J U S.

**S**uccus ex ea extractus addito momento mellis servit pro oris pustulis, ore cum eo peruncto. *Radix* trita & decocta in lacte *Coqui Indici* conducit in morbo sacro factâ perunctione.

FIG. 55.

Magnam hanc plantam cum præcedente obtinere assuetam, ex plerisque ejus partibus liquet; quare & non inconvenientè *Polypodium Indicum minus*, *Polypodium minus*, vocari posse existimem. An autem etiam *Indigo* præbeat, quamvis verosimile videatur, asserere non audeo: multo minus eandem esse cum *Malagafarum* *Rapetis*, cum ejus florem & fructum intenderetur, hujus autem inodori et saporis. *Hernandez* &

*Brachar*, *Historiæ Mexicanae* lib. 4to, hinc quoque plantas describunt, quæ caeruleo tingunt colore, quæ utrumque vocant *Xubiquiti Petaloti*, seu *Aub tenuisolum*, ipsam autem pigmentum caeruleum sive *Indigo Mahuali* & *Ticobulli*. Neutra autem cum hic descripta plants, quædam. Prior verò eadem videtur cum *Cassipoua* *fruticosa* *Pisoni*.



SCHA-







Schageri-Cattam. Lor.

உருகிய ச. mal.

جَامَارِيَّ  
مَظْمُومِ Arab.

வெட்டி bram.





MALABARICUS. 105  
SCHAGERI-COTTAM.

FIG. 56.



*Schageri-Cottam*, quæ secunda species, lingua Bramanum, *Sasali*, est arbuscula humilis, altitudine unius hominis, nascens in arenosis.

*Radix* ramos fibrosos spargens, cortice rubro-sanguineo ac exterius nigricante crustula infusato, ligno albicante, qui saporis est adstringentis.

*Caudex* crassitie unius brachii.

*Surculi* vetustiores cinerei, teneriores spadiceo-clari.

*Folia*, quæ in furculis petiolis curtis, rotundis, viridibus proveniunt, sunt multo majora illis primæ speciei, oblonga, anteriùs cuspidè eminentia, ad petiolum lata cavitate, crispata, in recta parte viridi-fusca & parum nitentia, in adversa clara.

Ex petiolo cum costa media, ex qua hinc inde *Costulae* obliquo arcuato ductu anteriora versus exeunt, utrinque *Costula* lateralis erumpit, suntque costulae omnes duræ, lignosæ, rotundæ, & in adversa parte maximè eminentes, coloris viridis seu spadiceo-clari, ex se diffundentes numerosos *Nervulos* transversos, qui in eadem parte adversa eminent ac rectam tractibus suis striant; suntque folia contextura grossa, & in adversa parte ob nervorum eminentiam valde scabra.

*Flores* proveniunt in summitate furculorum in petiolis, plures congregatim ac tres simul conjuncti, constantque quatuor & quinque foliis oblongo-rotundis, angustis, surrectis, ex viridi albicantibus & subflavescentibus, quæ cum oris interiora versus cochleatim contracta sunt, habentque in medio congeriem numerosorum staminum tenuium, quæ flavis, rotundis ac parvis apicibus dotata sunt, ac stylum viridi-dilutum ex globulo viridi-fusco, qui primordium fructus est, emergentem, suntque flores inferiori parte foliis angustis ac flaviusculis succincti.

*Fructus* sunt baccæ oblongo-rotundæ ac nonnihil pyri-formes, ad petiolum stricti, coloris primùm viridifusci ac surdi, dein nigri & nitentis, suntque sapore

Ecc

pri-

primum acido, qui ex maturitate dulcescit, atque indigenis est in eduliis: in medio durum, ex albicante subflavum, & grandiusculum ac pyriforme ossiculum est, quod in totum filamentis densis, quæ in arcus varios ordinate ad se invicem conducta sunt, est obductum.

## V I R E S E J U S.

**A**Rdori membrorum restinguendo servit *Succus ejus* expressus, ac cum saccharo sumptus, cum ejus decocto os abluitur pro columellæ tumefactæ relaxatione. *Foliorum succus* cum saccharo epotus maximè conducit pro hepate & fluxu ventris, ejus lotio pro oris pustulis uti & in angina cum eodem succo mixto cum aceto guttur commodè abluitur. *Eorum* decoctum cum saccharo epotum proficuum est pro febre frigida.

## F I G. 36.

Aëoris hujus non unam dari speciem, ex *Auronum* vertis liquido apparet: præterea cum folia hujus multo majora esse tradant folia primæ speciei: cujus figuram cum descriptione citæ non addiderunt, divinare nequeo. Certe si ipsa esset æthereæ plantæ hic exhibitæ, eam ad *Aëreum* sive *Caryophyllum* referre non

debuisse, imprimis ob fructum non multum dissimilem, ejusque saporem græco-acidum. Jam autem de aliâ ob æthereâ, utriusque plantæ communia, vocare libuit, *Caryon Malabaricum*, sive *cardamomum*, esseque *runcos elstis*.



C A R D A

Allegory





Carua. lat.  
 ကုသုသ mal.  
 قارورة Arab.  
 तसवि bram.







## CARUA.

FIG. 57.



*Arus*, alio nomine *Babena*, ling. Bramanum *Tiqui*, est Fig. 57.  
arbor ad altitudinem quatuor quinqueve hominum assurgens.

*Radix* crassa, recta se in terram demittens ac hinc inde fibris transversis se affigens, cortice in exteriori crusta rufo-cinereo, sub eâ rubescente, qui sortem camphoraceum odorem spirat maximè tritus, ligno est duro, solido & albicante, odoris nullius.

*Caulis* ambitu amplexum unius brachii implens, diffundensque numerosos ramos & furculos, estque cum ramis cortice vestitus viridi, qui dein cum ætate rubescit, ac cum pellicula tenui lignum ambit & crusta cinerea obductus est, ac ligno duro, estque is cortex suo tempore deglubitus & in sole exsiccatus ipsum *Cinamomum*; verùm quod hic habetur, minùs acre est quàm illud *Celonense*, ac velut sylvestre; cortice omni ex parte deglubito arbor emoritur.

*Folia* cum bina, tum solitaria proveniunt petiolis curtis ferme semipollicaribus, crassiolis, & interiùs latè striatis, suntque forma oblongo-rotunda longitudine ad latitudinem ferme dupla, in summitate cuspidata, latitudine proximum ad medium cum minora & teneriora sunt, proximè versus petiolum, quæ maxima longitudinè unius ferme spithamæ & amplius, superficie plana, in oris albicante zonula seu nervulo, quæ ex petiolo excurrit præcincta, vitoris in recta parte vegeti & viridi, in adversa viridi-diluti; cum tenera sunt, coloris hepatici, prout vetustiora, sicciora, & magis rigida, ac fractu facilia sunt, & in minorem ambitum contracta & vtrius interiora crispa.

E petiolo tres *Costæ* viridi-dilutæ ac flavescences excurrunt cum costâ intermedia quæ nonnihil crassior est utrinque una, in recta et adversa parte extantes; suntque hæc duæ laterales primum brevi intervallo rectis tractibus nectentes, ac ad mediam junctæ, atque inde obliquo ac annulatiu inflexo ductu anteriora versus altè ascendunt, ac proximè ad cuspidem progrediuntur. Ubi in venulas subriles, quæ versus cuspidem descendentur, disparent; ex costis extantibus plurimæ fibræ seu vcnæ intimo tractu per ipsum folium transversim egrediuntur, subtili cancelliformium venularum contextu comitatæ, suntque in majoribus foliis nonnihil eminentes, unaximè in recta parte: folia sunt forti ac aromatico odore, præcipuè trita, ipsum cinamomi odorem spirantia, & sapore quoque cinamomi, licet minus vegeto; folia tenerissima rubescentia.

*Floris* petiolis viridi dilutis, qui supra ex origine foliorum prodeunt plures congregati seu umbellatim proveniunt, suntque stelliformes, ac parvi, constantes sex foliis viridi diluto-albicantibus, parim oblongis ac rotundis oris, anteriora versus contractis, ac brevi collo seu pediculo odoris anæmi, in medio corculum est constans ex duabus staminum seriebus, in exteriori serie stamina sex viridicla,

Fff

clara, supra alia emicantia ac viridi-diluta, in superiori parte plana ac latiora; in anteriori serie sex stamina tenuia ac parva sunt cum nodulis seu apicibus flavis & crassiusculis in vertice, atque in ea serie exiis insuper tria stamina cum illis, quæ in exteriori ordine similia paribus intervallis emicant, completentia stylum tenue ac viridem, in vertice nigricantem, qui ex capitulo viridi-oblongo, quod primordium fructus est ac in pediculis superiori parte continetur, egreditur; floribus ad pediculum adest calyx arctus & exiguus.

*Gemma Florum* rotundior.

*Fructus* sunt baccæ oblongo-rotundæ terite forma instar glandis quercinæ arctè inclusi in calyce profundissimo, crassissimo, viridi, qui sex cuspidum est, suntque superficie glabri primum viridi-fusci & nitentes ac punctulis albicanibus conspersi, & tunc sub cortice pulpa viridi-clara, quæ flaviusculum, unctuosum humorem exsudat, & saporis subacris adstringentis & unctuosi, continentque sub pulpa corticis unum grandem nucleum oblongo-rotundum & glabrum, qui cortice tenui cartilaginolo obtectus est & pulpa densa ex albo rubescente ac incarnati coloris & humore unctuofo, qui in filamenta protrahitur, suffusa, ac saporis magis acris & minus adstringentis est, constat, dein cum maturi sunt, coruleo-fusci & nitentes, qui color est in tenui exteriori membrana, intus etiam pulpa viridi saporis aromatici ac subamari & acris ac pulpa nuclei ex rubro cæruleescente constantes.

*Floræ* hæc arbor semel fert in anno in *junio*.

Ex cortice radicis *Oleum* cum sale volatili, Camphora dicto, per distillationem extrahitur estque aqua cum qua simul ascendit levius, consistentia clarum & transparens, ac coloris subflavescentis, odoris fortis ac vegeti, saporis peracris & profundè penetrantis constans ex particulis tenuibus & facillè se dissipantibus in libero & aperto aëre; Camphora candidissima est, & in odore Camphora communi excellentior: ejus particulæ in oleo primum distillato nant, ac ejus partibus insensibiliter permixtæ sunt, olei transparentiam ac claritatem minime obscurantes, dum autem oleum refrigeratur, particulæ Camphoræ natantes ac se junctæ, unæ aliis formâ satis regulari se assigunt, constituentes primum hastas oblongas, quibus partes aliæ de novo accedentes velut transversæ acus ad rectos angulos se adjungunt, atque ita graviotes factæ decidunt atque ad fundum olei subidunt: verum hæc notatu dignissimum est, quod dum se assigunt in duos vorticiferos motus, qui per horizontalia plana feruntur, cieri ac primum quidem tardius, dein sensim velocius, atque oleum ad suam superficiem ubi prius refrigeratur, & ad fundum plurimis particulis Camphoræ, quæ ejus transparentiam adimunt, imbutum, cum in medio adhuc sit clarum seu magis transparens, quin et particulæ Camphoræ, quæ se sibi mutuo assigunt, partes oleosæ primum intra se includunt, eas visui subducentes, quæ dein particulis salis ad angustius spatium versus inferiora detrusæ se ab iis resolvunt ac separant, superiora præ levitate petentes; est autem Camphora hæc maximè dissipabilis & flammam celerrimè concipiens ac nullam faciem post flagrationem relinquens; de Oleo quod cum hoc Sale attollitur hæc notanda occurrunt, primum quod in odore ac sapore Camphoræ maximè æmuletur, atque adeo facillè dissipabilis sit, ut licet in pannos incidat colore aliquo tinctos, nulla relicta macula evanescat ac diffusetur; promptissimum quoque est ut ipsa Camphora in flammâ

flamma concipienda in eo spiritum vini ab aqueis particulis depuratum referens, rotumque brevi tempore igne depascitur, datque flammam albicantem & cœruleam, super igne positum & calefactum etiam cito consumitur, abitque in fumum albicantem, qui igne admoto flammare promptissime concipit; de eo quoque expertum est, si linteum cum eo calefactum incendatur, eo remanente illa igne plurimas ejus partes depasci, uti patet, si ignis jam conceptus ex sufflatione illico suffocetur, quin & illud linteum, quod ex igne illa exsumredit, ac primum acrem camphoraceum odorem exhalat, eo debilitato & evanescente gratum aliquem Cinnamomi odorem spirare: præterea hoc oleum in sulphur vel sal nitrunt, vel etiam in illos sales simul permixtos conspersum, iis prorsus illibatis ac illis, à flamma in totum consumi ac depasci; quod si pulvis tormentarius eo imbutus sit, flammam concipit eo accenso, sed non nisi tardius, & postquam multæ particulæ olei depastæ sunt; singulare quoque experimentum est, quod sinus olei, qui ex eo calefacto super ignem exhalat, per pannum triplicatum seu quadruplicatum exceptos ad ejus superficiem in salem album & candidum, quod ipsamet Camphora est, se affigit, quin & hoc oleum, ut purum & clarum sit, cum tempore particulas quasdam camphoraceas demittit. Relatum quoque nobis est in locis frigidis, quod erat advectum, de suo fluore remittere. Oleum, quod ex hoc Malab. Cinnamomo extrahitur, transparens, clarum, flavum, rutilans ac fragrantis quoque odoris, & aquæ innatans, cum ex cinnamomo Celonensi, præter oleum innatans, etiam extrahatur quod aquæ fundum petat. Oleum ex foliis primum turbidum est, cum tempore flavescens ac transparens coloris viridescens, estque sapore quoque dulci & acri odorem cinnamomi tenuem spirans, in aqua subsidit ad fundum.

## VIRSEUS.

**R**adix cortex in decocto datus vel in pulvere cum melle seu saccharo servit pro tussi & phlegmate expurgando. Idem contritus & permixtus cum aqua confert in podagra facta perunctione. Cortex Scipitum in decocto datus status quoque discutit. Idem in pulvere datus cum aqua calida dolores ventris sedat fluxumque ex frigore oborrum sistit. Foliorum succus cum pipere & saccharo datus pro doloribus ventris & renum flatulenta materia servit; folia in pulvere data cum saccharo confcrunt in vertigine capitis, uti & flores in pulvere cum saccharo & aqua frigida dati. Oleum quod ex Cortex Radice cum sale volatili, Camphora dicto, per distillationem simul extrahitur: insignium & mulrarum est virium; optimè confert in omnibus affectibus paralyticis exterius in tempore applicatum: in podagra summum ac præsentaneum remedium; vehementes partium affectuum dolores illico sedans iis inunctum, ad quod etiam confert intus sumptum; in asthma aliisque affectibus pulmonaribus sanandis intus sumptum etiam maximè confert, uti & ad malignitatem febrium corrigendam, estque sudorem pellens in gangræna & sphacelo aliisque ulceribus malignis optimè quoque prodest, juvatque etiam pro imperiginibus, doloribus artuum, ventris, oculorum; nec non tumoribus membrorum ex frigidis & pituitosis humoribus obortis; præterea in pedum contusione ut & vulneribus sensum partium stupefactum reparans; prodestque in rheumate

Fff 2

feu

feu fluxu capitis; ejus odor qui illico ex titillatione ac sternutationem, quam rheuma, ciet, sistit; in flatibus discutiendis quoque efficax est intus sumptum: appetitum quoque excitat ac calculosis prodest, suntque hæc virtutes intra breve tempus, quo illud oleum à nobis distillatum, ad usum medicum adhibetur, propria experientia compertæ, & sine dubio plures indies se prodent, estque hoc oleum in Nosocomio nostro medicamentum maximè catholicum. *Camphora* servit in affectibus uterinis ad provocanda menstrua, sudores quoque ciet, usurpaturque etiam loco *Camphoræ* communis. *Oleum Cinnamomi* puta *Corticis Arberi* confert in affectibus ventriculi, ut torminibus ventris à frigore ortis. *Aqua Cinnamomi* cardiaca. *Oleum ex Folis* prodest in Colica exterius applicatum, summum remedium paralyticis, eorum aqua conducit in affectionibus cardiacis frigidis, daturque in potionibus sudoriferis. *Aqua Florum Cinnamomi* distillata cardiaca. *Oleum ex Fructibus* decoctum usurpatur in doloribus artuum.

## F I G. 57.

Arbor hic descripta *Cassia* est *Malabarica*: *Lulesianis*, *Cassia del Maris*: quæ *Crylonensis* omnibus suis partibus longè est ignobilior & siccior longè minor in pretio habita: Singula enim quæ de *Malabarica* prædicantur ab Autoribus, fulgentiori gradu in *Crylonensi* repetuntur, quam quidem pluribus hic ut describerem, & gauderet animus, & materia exigere æstima, quin & nobilitas. Verum cum aliorum labores meos facere nolim, hanc Impada D<sup>ni</sup> *Hirnas* lubens trado, qui suo tempore exactissimam *Cinnamoni*, omniumque plantarum *Crylonensium* historiam, posteritati non invidet. Adjungere tamen lubet, coronidis loco, ipsius verba, quibus *Cinnamoni* ramos complures, unâ cum ar-

bustulis vegetis, seminibus, radicibus, &c. ad me transmittit. *Cassia* (inquit) ex qua *Cinnamomum*, *Radix ferrium Cingelensium*, promittitur augere *Kuranda*: unde est *Laurus Zeylanica*, hæc calyculata, ex qua *Cinnamomum*. Mira natura diversitas in hoc arbore conspicitur: desilatur extradit cortex, *Camphora*, ejusdemque oleum: ex runci cortex, oleum *Cinnamomi*: ex foliis, oleum *Caryophyllatum*: ex fructibus, oleum *juniperis* simile, cum paucis *Cinnamomi* & *Caryophyllatum*, mixtum: ex his & exquiratur oleum pingue, crassum, infusum, ad emplastra, unguenta, ac candelas conficiendas, siccissimum; medicamentum videri interni & externi usumque, summi æqueque.



# I N D E X.

A.	Fol.		Fol.
<b>A</b> Gati. Fig. 51.	95	Cudu-pariti. Fig. 11.	
Ambalam. Fig. 50.	21	Cumbela. Fig. 41.	75
Amabapaja feu Papaja.		Curutu-pala. Fig. 46.	85
Fig. 15.	21	E.	
Ameri feu Anil. Fig. 54.	101	Elengi. Fig. 20.	33
Ampana. Fig. 10.	13	I.	
Appel. Fig. 53.	22	Ilii, feu Bambu. Fig. 16.	35
Arealu. Fig. 18. feu 17.	42	Itri-Alu. Fig. 16.	45
Atti-Alu. Fig. 25.	43	M.	
B.		Mail-anfchi. Fig. 40.	73
Bala feu muza Serapionis. Fig. 12. 13.	14.	Manjapumeram. Fig. 21.	35
fol. 17	32	Malacca, Schambu. Fig. 17.	27
Balam-pulli, feu Tamarindus. Fig. 13.	32	Marotti. Fig. 36.	65
Bupariq. Fig. 12.	51	N.	
C.		Nati-fchambu. Fig. 18.	29
Cada-pilaua. Fig. 52.	27	Nili Camaram. Fig. 38.	62
Caniram. Fig. 37.	67	O.	
Canschena-pou. Fig. 55.	63	Odallam. Fig. 38.	71
Canschi. Fig. 42.	76	P.	
Carim-pana. Fig. 2.	11	Pajanelli. Fig. 44.	72
Carua feu Canella Malibarica. Fig. 57.	107	Pala. Fig. 45.	81
Cat-Ambalam. Fig. 50.	23	Palega-pajanelli. Fig. 41.	72
Cavalam. Fig. 49.	82	Papajamaram. Fig. 15.	23
Caunga feu Fauler. Fig. 3. 6. 7. 8.	2	Pariti feu Tali-pariti. Fig. 30.	53
Champacam. Fig. 19.	1	Peralu. Fig. 27. feu 18.	42
Chovanna-mandaru. Fig. 32.	17	S.	
Chovanna-mandaru, fecunda species.	17	Schageri-Cottam. Fig. 16.	105
Fig. 33.	fol. 59	Schunda-pana. Fig. 11.	55
Codaga-pala. Fig. 47.	85	T.	
Coddam-pulli feu Carcapuli Acofta.		Tenga, feu palma Coccifera. Fig. 1. 2.	fol. 1
Fig. 24.	fol. 41	1. 4.	
Colinil. Fig. 55.	103	Tinda-parua. Fig. 48.	87
Conna, feu Caffia Fiftula. Fig. 22.	37	V.	
		Velutta-Mandura Fig. 34.	61

## Admonitio ad Bibliopegum.

*In hoc libro agglutinanda sunt folia tam descriptionum, quam Figurarum, tenuibus foliis, non fecus ac fieri solet in Atlantibus majoribus Geographicis, illa autem folia descriptionum quæ non sunt bifecta, integra relinquenda sunt, exceptis illis, in quorum medio Figure sunt collocanda. Porro Figure ponende juxta folia sequentia, & Errata ut sequitur corrigenda.*

### Errata autem corrigenda ut sequitur:

*In Figura. Arealu pro 18. leg. 17. Peralu pro 17. leg. 18. Curutu-Pala pro 47. leg. 46. Codaga-Pala pro 48. leg. 47. In folio descriptionum. Palega-Pajanelli, pro 44. leg. 41. Tinda-Parua pro 47. leg. 43. Cavalam pro 10. leg. 42. Pajanelli pro 45. leg. 44. Pala pro 46. leg. 45. Ambalam pro 11. leg. 50. Agati pro 51. leg. 11.*

### Berigt aen de Boekbinder.

Dit Boek moet met strooken gebonden werden, soo wel de Letter-druk als de Figuren, gelijk als de grote Atlaffen werden gebonden, en moeten de Letter-bladen, die niet door sijn gefneden, geheel blyven, uytgenomen die, daar Figuren in 't midden moeten geplaatst werden, en sullen de Figuren werden gestelt op de bovenstaende Folien; en de Misstellingen ook soo werden verbeterd als volgt:

*In de Figuren. Arealu voor 18. slegt deselve op 17. Peralu voor 17. slegt deselve op 18. In de bladen der beschryvingh. Palega-Pajanelli voor 44. slegt deselve op 41. en moet soo voort d'eene Figur voor d'ander gestelt worden tot Ambalam toe. Agati voor 51. slegt deselve op 11. en zijn dit de nummers der Figuren, en niet van de Pagien.*

















